

# 予 防 接 種 案 内

2019年度（2019年4月から2020年3月まで）の日程です。

予防接種の種類	接種できる年齢	標準的な接種年齢	接種回数	接 種 日		接種場所など
BCG (結核)	1歳に至る (誕生日の前日)まで	生後5か月 〃 8か月まで	1回	4月8日(月)	4月22日(月)	苫小牧市教育・ 福祉センター3階 (本幸町1丁目2番21号)  受付時間 13:30~14:30  接種開始時間 14:00~  料 金 : 無 料
				5月13日(月)	5月27日(月)	
				6月10日(月)	6月24日(月)	
				7月8日(月)	7月22日(月)	
				8月5日(月)	8月19日(月)	
				9月2日(月)	9月17日(火)	
				10月7日(月)	10月21日(月)	
				11月5日(火)	11月18日(月)	
				12月2日(月)	12月16日(月)	
				【2020年】		
				1月6日(月)	1月20日(月)	
				2月3日(月)	2月17日(月)	
				3月2日(月)	3月16日(月)	

## 【その他予防接種の実施医療機関について】

下記医療機関で通年実施しています。(料金：無料)

接種日・時間等は病・医院により異なりますので、お電話等でご確認ください。

### 定期予防接種実施機関一覧

所在地	医 療 機 関 名	電 話 番 号	Hib(ヒブ)	小児の	B型肝炎	ジフテリア	麻しん	水痘	ジフテリア	日本脳炎
			感染症	肺炎球菌	予防接種	百日せき	風しん	(水ぼうそう)	破傷風	予防接種
1 明野新町	苫小牧東病院	55-8811								
2 旭 町	沖 医 院	32-8870					○		○	
3 音羽町	合田内科小児科医院	33-9208	○	○		○	○	○	○	○
4 川沿町	横山内科消化器科	74-0011							○	
5 川沿町	たかせ内科クリニック	73-6233					○	○	○	○
6 桜木町	桜木ファミリークリニック	71-2351	○	○	○	○	○	○	○	○
7 清水町	苫小牧市立病院	33-3131	○	○	○	○	○	○	○	○
8 新中野町	みなかみ医院	32-2335	○	○		○	○	○	○	○
9 住吉町	とまこまいこどもクリニック	33-1050	○	○	○	○	○	○	○	○
10 青雲町	方安庵青雲町クリニック	61-5555	○	○	○	○	○	○	○	○
11 大成町	やまざきこども医院	75-1133	○	○	○	○	○	○	○	○
12 拓勇東町	とまこまい北星クリニック	57-8000	○	○	○	○	○	○	○	○
13 拓勇西町	たくしん小児科	53-7788	○	○	○	○	○	○	○	○
14 東開町	さくらファミリークリニック	55-6526	○	○	○	○	○	○	○	○
15 //	浪岡内科消化器科クリニック	51-2811	○	○	○	○	○	○	○	○
16 ときわ町	いちむら小児科医院	67-1111	○	○	○	○	○	○	○	○
17 日新町	たかやなぎ小児科	71-2115	○	○	○	○	○	○	○	○
18 北栄町	うとないキッズクリニック	53-8080	○	○	○	○	○	○	○	○
19 //	レディースクリニックぬまのはた	53-0303								
20 北光町	稲岡内科小児科	72-5141	○	○	○	○	○	○	○	○
21 本 町	阿部内科医院	36-0066					○			
22 緑 町	加藤胃腸科内科クリニック	35-2125	○	○		○	○	○	○	○
23 宮前町	錦 岡 医 院	67-0013	○	○	○	○	○	○	○	○
24 若草町	王子総合病院	32-8111	○	○	○	○	○	○	○	○

お問合せは苫小牧市健康支援課まで

電話：32-6407 FAX：32-4322

E-mail：kenkosien@city.tomakomai.hokkaido.jp

		3	6	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		か	か	か	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳
ヒブ Hib	4~1回 (初回接種年齢により異なる)	※生後2か月~60か月に至る(誕生日の前日)まで (標準的な接種期間: 生後2~7か月に至るまで初回接種) (初回接種終了後7~13か月の間隔をあけて追加接種)																						
小児用肺炎球菌	4~1回 (初回接種年齢により異なる)	※生後2か月~60か月に至る(誕生日の前日)まで (標準的な接種期間: 生後2~7か月に至るまで初回接種) (生後12か月~15か月に至るまでに追加接種)																						
B型肝炎	3回	※1歳に至る(誕生日の前日)まで (標準的な接種期間: 生後2か月に達した時から9か月に達するまでの間)																						
ジフテリア 百日せき ポリオ 破傷風	第1期 4回	初回接種(20~56日の間隔をあけて3回) 追加接種(初回3回終了後12~18月の間)											※生後3か月~90か月(7歳半)に至るまで (標準的な接種期間*1のとおり)											
ジフテリア 破傷風 (DT)	第2期 1回	※11歳~13歳未満(誕生日の前日まで) (標準的な接種期間: 11歳に達した時から12歳に達するまで)																						
BCG	1回	※1歳に至る(誕生日の前日)まで (標準的な接種期間: 生後5か月に達した時から~8か月に達するまでの間)																						
麻しん (はしか) 風しん	第1期 1回	※生後12か月~24か月に至る(誕生日の前日)まで																						
	第2期 1回	4/2生まれ 10/1生まれ 4/1生まれ											※小学校入学前1年間(幼稚園・保育園の年長児)											
水痘 <small>かかったことのある方は接種が必要です</small>	2回	※生後12か月~36か月に至る(誕生日の前日)までに3か月以上の間隔をあけて2回 (標準的には1回目の接種は生後12~15月の間、2回目の接種は1回目終了後6~12か月の間)																						
日本脳炎	第1期 3回	※生後6か月~90か月に至る(誕生日の前日)まで (標準的な接種期間: 3歳に達した時から4歳に達するまでの期間で初回接種) (初回接種終了後概ね12か月経過後に追加接種)																						
	第2期 1回	※9歳~13歳未満(誕生日の前日まで) (標準的な接種期間: 9歳に達した時から10歳に達するまでの期間)																						
子宮頸がん 予防 (HPV)	3回	サーバリックス(2価) 1回目から1か月以上あけて2回目を、2回目から5か月以上あけて3回目を接種											※小6~高1相当年齢											
		ガーダシル(4価) 1回目から2か月以上あけて2回目を、2回目から4か月以上あけて3回目を接種																						

↓ 接種時期    ■ 標準の対象年齢    □ 法律上の対象年齢

※1  
ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風の標準的な接種期間  
  
1期初回(計3回)生後3か月に達した時から12か月に達するまでの期間  
  
追加接種  
1期初回接種(3回)終了後、12か月に達した時から18か月に達するまでの期間

○ 予防接種を受ける前に・・・

- 健康で体調の良いときに受けられるよう、普段から健康管理に気をつけましょう。
- 「予防接種のしおり」をよく読んで、必要性や副反応及び健康被害についてよく理解しましょう。

※ 予防接種を受けることができない方

- 37.5度以上の発熱のある方
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなる方
- 受ける予防接種の成分によって、アナフィラキシー(接種後30分以内に起こるアレルギー反応)を起こしたことのある方
- その他、医師が不適当と判断した場合

※ 特に、病気などで治療や指導を受けている方は、主治医の先生がいる場合には必ず前もって診ていただき、その医師のところで接種するか、診断書または意見書をもらってから接種に行きましょう。

○ 予防接種を受けるときは・・・

- 母子健康手帳、「予防接種のしおり」は忘れずにお持ちください。
- 予診票は医師への大切な情報です。責任をもって正確に記入しましょう。
- 接種を受ける子の日頃の状態を良く知っている保護者の方が連れて行きましょう。保護者が同伴できない場合、被接種者の健康状態を普段より熟知する親族等の方が同伴できます。ただし、その場合は予診票の他に委任状が必要です(委任状は『予防接種のしおり』に付属しています)。

○ 予防接種を受けた日は・・・

- 入浴は差し支えありませんが、接種した部位はこすらないようにしましょう。
- いつもどおりの生活をして構いません。ただし、激しい運動は避けましょう。

※ 接種後のお子さんの健康状態に注意しましょう

予防接種後、患部のひどいはれ、高熱、けいれんなど異常な反応がありましたら、速やかに医師の診察を受けてください。

○ 次の予防接種を受けるときは・・・

- 特別な場合を除き、予防接種の効果や安全性のために次の間隔を置くことになっています。
- ( ) は、任意で受ける予防接種です。

