

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
内科	010001A01	アクテムラ療法(関節リウマチ400mg/body)	28	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [400 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	投与量400mg/Body 投与時インラインフィルター使用 3回目までは開始から15分は10ml/時で
内科	010001A02	アクテムラ療法(関節リウマチ8mg/kg)	28	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	投与時インラインフィルター使用 3回目までは開始から15分は10ml/時で
内科	010001A03	アクテムラ療法400mg/body(全身型若年性特発性関節炎・キャッスルマン病)	14	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [400 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	投与量400mg/Body 投与時インラインフィルター使用 3回目までは開始から15分は10ml/時で
内科	010001A04	アクテムラ8mg/kg (全身型若年性特発性関節炎・キャッスルマン病)	14	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	投与時インラインフィルター使用 3回目までは開始から15分は10ml/時で
内科	010001B04	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 1投目】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	【COVID-19】 ステロイドとの併用が必要 【副腎皮質ステロイドと併用が必要】 インラインフィルター使用
内科	010001B05	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 2投目】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	【COVID-19】 1投目終了後8時間以上あける インラインフィルター使用
内科	010002A01	オレンシア療法(60kg未満)①～③回目	56	オレンシア点滴静注用(250mg) [500 mg/Body]<1,15,29> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15,29> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15,29>	内科	60kg未満 インラインフィルター使用
内科	010002A02	オレンシア療法(60kg未満)④回目以降	28	オレンシア点滴静注用(250mg) [500 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	60kg未満 インラインフィルター使用
内科	010002A03	オレンシア療法(60～100kg)①～③回目	56	オレンシア点滴静注用(250mg) [750 mg/Body]<1,15,29> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15,29> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15,29>	内科	60kg以上100kg以下 インラインフィルター使用
内科	010002A04	オレンシア療法(60～100kg)④回目以降	28	オレンシア点滴静注用(250mg) [750 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	60kg以上100kg以下 インラインフィルター使用
内科	010003A06	レミケード療法(10mg/kg上限 8w毎)④回目以降	56	レミケード点滴静注用 (100mg) [10 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	ベーチェットのみ！ インラインフィルター使用 ④回目以降、効果不十分時の10mg上限/8w毎レジメン
内科	010003A7	レミケード療法(5mg/kg)①～③回目	98	レミケード点滴静注用 (100mg) [5 mg/kg]<1,15,43> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,15,43> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15,43>	内科	ベーチェットのみ インラインフィルター使用
内科	010003A8	レミケード療法(5mg/kg継続用・④回目以降)	56	レミケード点滴静注用 (100mg) [5 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	ベーチェットのみ インラインフィルター使用
内科	010004A01	インフリキシマブ(3mg/kg)①～③回目	70	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 [3 mg/kg]<1,15,43> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,15,43> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15,43>	内科	インラインフィルター使用
内科	010004A02	インフリキシマブ(3mg/kg)④回目以降	56	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 [3 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	インラインフィルター使用
内科	010004A04	インフリキシマブ(6mg/kg 4w毎)④回目以降	28	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	インラインフィルター使用 ④回目以降、効果不十分時の期間短縮レジメン

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
内科	010004A06	インフリキシマブ [®] (10mg/kg上限 8w毎)④回目以降	56	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[10 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	インラインフィルター使用 ④回目以降、効果不十分時の10mg上限/8w毎レジメン
内科	010004B01	インフリキシマブ [®] (5mg/kg) ①～③回目	70	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1,15,43> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,15,43> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1,15,43>	内科	乾癬、潰瘍性大腸炎、クローン病 インラインフィルター使用
内科	010004B02	インフリキシマブ [®] (5mg/kg) ④回目以降	56	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	乾癬、潰瘍性大腸炎、クローン病 インラインフィルター使用
内科	010004C01	インフリキシマブ [®] (強直性脊椎炎5mg/kg)①～②回目	42	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1,15>	内科	インラインフィルター使用
内科	010004C02	インフリキシマブ [®] (強直性脊椎炎5mg/kg 6週毎)③回目以降	42	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	6～8週間隔 インラインフィルター使用
内科	010005A01	ペンリスタ(10mg/kg ①～②回目)【患者限定】	28	ペンリスタ点滴静注用(120mg)[10 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1,15>	内科	
内科	010005A02	ペンリスタ(10mg/kg ③回目以降/4週毎)【患者限定】	28	ペンリスタ点滴静注用(120mg)[10 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	
内科	010006A01	サフネロー300mg/Body/4w (患者限定)	28	サフネロー点滴静注(300mg/2mL)[300 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml)[98 mL]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	
内科	010010B01	IVCY (15mg/kg/2w)	14	ポタコールR輸液(500ml)[1 袋]<1> ラシックス注 (20mg/2ml)[1 A]<1> プリンペラン注射液0.5% (10mg/2ml)[1 A]<1> 注射用エンドキサン(500mg)[15 mg/kg]<1> YDソリター-T3号輸液(500ml)[1 本]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	ケモセーフセット使用
内科	010010B02	IVCY (500mg/m ² 2w)	14	ポタコールR輸液(500ml)[1 袋]<1> ラシックス注 (20mg/2ml)[1 A]<1> プリンペラン注射液0.5% (10mg/2ml)[1 A]<1> 注射用エンドキサン(500mg)[500 mg/m ²]<1> YDソリター-T3号輸液(500ml)[1 本]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	ケモセーフセット使用
内科	010010B03	IVCY (750mg/m ² 4w)	28	ポタコールR輸液(500ml)[1 袋]<1> ラシックス注 (20mg/2ml)[1 A]<1> プリンペラン注射液0.5% (10mg/2ml)[1 A]<1> 注射用エンドキサン(500mg)[750 mg/m ²]<1> YDソリター-T3号輸液(500ml)[1 本]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	ケモセーフセット使用
内科	010110A01	リツキサン療法(患者・適応症限定)	7	注]リツキサン注(100mg/10ml)[375 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml)[1 mL]<1> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1>	内科	要処方プレメディ 25ml/時で開始。問題なければ1時間後100ml/時、2時間後200ml/時までUP 2回目以降100ml/時で開始、その後1時間毎に100ml/時ずつ400ml/時までUP

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
内科	010110A02	リツキシマブBS療法	7	注]リツキシマブBS点滴静注 (100mg/10ml) [375 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 mL]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	内科	要処方プレメディ 適応差はリツキサン投与 25ml/時で開始。問題なければ1時間後 100ml/時、2時間後200ml/時までUP 2回目以降100ml/時で開始、その後1時間 毎に100ml/時ずつ400ml/時までUP
内科	010111A01	血球貪食症候群(VP16単剤)(患者限定)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1.5 バイアル]<1-3> エトボシド点滴静注液(100mg/5ml)「SN」 [150 mg/m ²]<1-3> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1-3> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-3>	内科	
内科	010201C01	ヘルケイト(皮下投与)(患者限定)	7	毒)ベルケイト注射用(3mg) [1.3 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1>	内科	前回と同じ位置へ投与は避ける。
内科	010202A01	Ara-C+ACR (患者限定)	14	キロサイド注 (40mg/2ml) [10 mg/m ²]<1-14> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1-4> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-4> アクラシノン注射用 (20mg) [14 mg/m ²]<1-4>	内科	AML 寛解導入療法 65歳以上
内科	019003A01	【治験】 JA43563 (1投目)	14	ソル・メドロール注 (40mg) [2 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> アセリオ静注液1000mg/バッグ (10mg/ml) [1 袋]<1> ポララミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1> JA43563(40ml/V)(治験薬) [1 バイアル/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [210 mL]<1>	内科	治験薬:12ml/hで開始、30分毎に25→37→ 50→62→75→87→100ml/hへ増量
内科	019003A02	【治験】 JA43563 (2投目)	14	ソル・メドロール注 (40mg) [2 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> アセリオ静注液1000mg/バッグ (10mg/ml) [1 袋]<1> ポララミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1> JA43563(40ml/V)(治験薬) [1 バイアル/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [210 mL]<1>	内科	
内科	019003A03	【治験】 JA43563 (3投目 4投目)	28	ソル・メドロール注 (40mg) [2 バイアル]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15> アセリオ静注液1000mg/バッグ (10mg/ml) [1 袋]<1,15> ポララミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1,15> JA43563(40ml/V)(治験薬) [1 バイアル/Body]<1,15> 生理食塩液(250ml) [210 mL]<1,15>	内科	3投目 24週目 4投目 26週目
内科	019003A04	【治験】 JA43563 (5投目 6投目)	28	ソル・メドロール注 (40mg) [2 バイアル]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15> アセリオ静注液1000mg/バッグ (10mg/ml) [1 袋]<1,15> ポララミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1,15> JA43563(40ml/V)(治験薬) [1 バイアル/Body]<1,15> 生理食塩液(250ml) [210 mL]<1,15>	内科	5投目 50週目 6投目 52週目
小児科	020001A01	アクテムラ療法(全身型若年性突発性関節炎 発症16才未満)	14	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	発症16才未満 投与時インラインフィルター使用
小児科	020002A01	リツキシマブBS (ネフローゼ上限500mg 患者限 定)	7	注]リツキシマブBS点滴静注 (100mg/10ml) [375 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 mL]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	ネフローゼ:上限500mg/回 x4 要プレメディ 投与30分前内服あり 25ml/時で開始。問題なければ1時間後 100ml/時、2時間後200ml/時までUP。
小児科	020003A01	レミケード療法(パーチエット5mg/kg 継続 用)	42	レミケード点滴静注用 (100mg) [5 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	6～8週間隔 インラインフィルター使用

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
小児科	020003A02	レミケード療法 (川崎病(25kg未満) 5mg/kg)	14	レミケード点滴静注用 (100mg) [5 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	インラインフィルター使用
小児科	020003A03	レミケード療法 (川崎病(25kg以上) 5mg/kg)	14	レミケード点滴静注用 (100mg) [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	インラインフィルター使用
小児科	020004A01	オレンシア(10Mg/kg 若年性特発性関節炎) ①～②回目	28	オレンシア点滴静注用(250mg) [10 mg/kg]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	小児科	若年性特発性関節炎【導入用】 インラインフィルター使用 75-100kg:750mg 100kg以上:1g
小児科	020004A02	オレンシア(10mg/kg 若年性特発性関節炎) ③回目以降	28	オレンシア点滴静注用(250mg) [10 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	若年性特発性関節炎 インラインフィルター使用 75-100kg:750mg 100kg以上:1g
小児科	029999A01	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 1投目(25kg 超え)】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	【COVID-19】25kg超え ステロイドとの併用 【副腎皮質ステロイドと併用が必要】
小児科	029999A02	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 2投目(25kg 超え)】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	【COVID】25kg超え 1投目後8時間はあける
小児科	029999B01	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 1投目(25kg 以下)】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	【COVID-19】25kg以下 ステロイドと併用 【副腎皮質ステロイドと併用が必要】
小児科	029999B02	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 2投目(25kg 以下)】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	小児科	【COVID】25kg以下 1投目後8時間はあける
外科	030001B01	Beva+FOLFIRI	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<3>	外科	
外科	030001B02	Beva+FOLFIRI(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030002B01	Beva+FOLFOX6	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<3>	外科	
外科	030002B02	Beva+FOLFOX6(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	
外科	030003B01	Beva+IRIS(CPT-11:125mg/m ²)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [125 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	外科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)
外科	030005B01	Beva+I-LV+5-FU(RPMI)	56	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15,22,29,36> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [250 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8,15,22,29,36> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [600 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1,15,29,43> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15,29,43> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36,43>	外科	
外科	030007A01	Beva10mg/kg+PTX90mg/m ² (乳癌)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [90 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,8,15> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [10 mg/kg]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	外科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
外科	030012B01	Beva+SOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [7.5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	S-1:Day1-14(朝・夕食後) S-1:Day1-14(朝・夕食後)

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030013B01	Beva+XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [7.5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	セ「ロータ」: 2000mg/m ² /2×14日間 カ「ベンシタピン」: 1回1000mg/m ² を1日2回 2週服用1週休薬
外科	030014B01	Bevacizumab単剤(5mg/kg/2週毎)	14	注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030014B02	Bevacizumab単剤(7.5mg/kg/3週毎)	21	注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [7.5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030014B04	Beva+ロンサーフ (倫)	28	注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	外科	ロンサーフ: Day1-5、8-12 併用 ロンサーフ: Day1-5、8-12 併用
外科	030020A03	Cetu単独療法(初回)	7	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、5錠服用 終了後1時間経過観察
外科	030020A04	Cetu単独療法(継続)	7	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、5錠服用 終了後1時間経過観察
外科	030023A01	Cetu(隔週500mg/m ²)+CPT-11(150mg/m ²)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [500 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> イリノテカン注(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、5錠服用 アービタックス終了後1時間経過観察
外科	030030A01	CDDP+S-1	35	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<8> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<8> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<8-10> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<8> 注]毒]シスプラチン注(10mg/20ml) [60 mg/m ²]<8> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<8> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<8-10> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [3 本]<8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<9-10> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<9-10>	外科	S-1: 21分(1日2回) S-1: 21日間服用(1日2回) CDDP投与1週間前にTS-1開始
外科	030040A01	CPT-11(イリノテカン)療法(A法)	35	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15,22> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15,22> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [100 mg/m ²]<1,8,15,22> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8,15,22> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030041A01	CPT-11+CDDP療法	28	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [70 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	外科	
外科	030050A02	Docetaxel(70mg/m ²)(食道癌)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」[70 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030050A03	Docetaxel(75mg/m ²)(乳癌・胃癌)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」[75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	通常量60mg/m ²
外科	030051A01	Docetaxel(3週毎・40mg/m ²)+S-1 (胃がん)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」[40 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	S-1:Day1-14(1日2回)80mg/m ² /日 S-1:Day1-14(1日2回)
外科	030060A01	EC療法	21	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> エビルピシン塩酸塩注射用(10mg) [90 mg/m ²]<1> 注射用エンドキサン (500mg) [600 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% 100ml [1 本]<1>	外科	Epi生涯投与量900mg/m ²
外科	030062A01	FOLFIRI	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」[200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」[400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」[2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<3>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030062A02	FOLFIRI(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	
外科	030063A01	FOLFOX6療法	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [4 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<3>	外科	
外科	030063A02	FOLFOX6療法(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	
外科	030064A01	FP療法	28	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-6> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」 (500ml) [250 mL]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [800 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液 (1L) [1 袋]<1-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	外科	休薬期間28日
外科	030070A01	Gemzar療法	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	外科	
外科	030070A02	Gemzar療法(Biweekly)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030070A03	Gemzar療法(乳癌)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1250 mg/m ²]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030071A02	Gemzar+CDDP(マンニトール)	21	マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1,8> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1,8> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [25 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8>	外科	
外科	030071A03	Gemzar+CDDP+S-1	14	マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [25 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1>	外科	S-1:Day1-7 胆道癌 1stLine S-1:Day1-7
外科	030072A01	GEM+S-1療法(3週クール)	21	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8>	外科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)
外科	030072A02	GEM+S-1療法(4週クール)	28	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	外科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)
外科	030073A01	GEM+PTX療法(乳癌)	21	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [2 バイアル]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [175 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1250 mg/m ²]<1,8> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8>	外科	Day1Rp1投与時レスタミン50mg、要確認アルコール可否 day(1):Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
外科	030076A01	Gemzar+アブラキサン	28	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [125 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8,15>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
外科	030080A01	IRIS(CPT-11:125mg/m ²)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [125 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	外科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)
外科	030082A01	I-LV+5-FU療法(RPMI)	56	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [250 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8,15,22,29,36> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [600 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36>	外科	
外科	030085A01	MTX+5FU	7	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注射用ダイアモックス (500mg) [250 mg]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> メイロン静注7% (20ml) [2 A]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注射用メソトレキセート (5mg) [100 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [600 mg/m ²]<1>	外科	Day1,ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠Day2,ロｲｺﾎﾟﾘﾝ錠45mg/3 × Day1ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠250mg(16時) Day2ロｲｺﾎﾟﾘﾝ錠45mg/3× 内服
外科	030086A01	Navelbine療法	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 毒)ロゼウス静注液(10mg/1ml) [25 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8>	外科	
外科	030090A01	Panitumumab単独	14	注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	インフュージョンリアクション注意:60分経過観察
外科	030091A01	Pani+CPT-11	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1>	外科	
外科	030092A01	Pani+FOLFIRI	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,3> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030093A02	Pani+FOLFIRI(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	
外科	030094A01	Pani+mFOLFOX6	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,3> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ソリアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1>	外科	
外科	030094A02	Pani+mFOLFOX6(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	
外科	030095A01	Pani+IRIS(CPT-11:125mg/m ²)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [125 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15>	外科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)
外科	030096A01	Pani+RPMI(5-FU/I-LV)	56	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36,43> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1,15,29,43> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15,29,43> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8,15,22,29,36> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [600 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030097C01	Pani+SOX(患者限定)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	外科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)
外科	030100A01	PMC療法	7	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-ワ」 [600 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	UFT-E併用 Day2-7
外科	030101A01	PTX+S-1療法	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [120 mg/m ²]<1,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	外科	要確認アルコール可否、レスタミン錠day1、S-1day1-14 S-1:day1-14内服。Rp1投与時レスタミン錠50mg内服
外科	030102A01	PTX(weekly 3投1休)(80mg/m ²)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	外科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
外科	030102A02	PTX(weekly6投2休)(100mg/m ²)	56	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15,22,29,36> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [100 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36>	外科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
外科	030102A03	PTX(triweekly 210mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [210 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
外科	030106A01	SOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	S-1:Day1~14(朝・夕食後) S-1:Day1-14(朝・夕食後)
外科	030112A01	XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	ゼローダ: 1回1000mg/m ² を1日2回14日間 カペシタビン: 1回1000mg/m ² を1日2回 2週服用1週休業

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030113A01	XP(ゼローダ+シスプラチン)	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	外科	ゼローダ: Day2-15(1日2回)1000mg/m ² /回 カベシタピン: 1回1000mg/m ² を1日2回 day2-15 CDDP後4日目以降、VFとソリタ中止可
外科	030114A01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+XP	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注】トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<2> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	外科	ゼローダ: 1回1000mg/m ² を1日2回、day2-15 カベシタピン: 1回1000mg/m ² を1日2回day2-15 CDDP後4日目以降、ソリューゲンとソリタ中止可
外科	030114A02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+XP	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注】トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<2> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	外科	ゼローダ: 1回1000mg/m ² を1日2回 Day2-15 カベシタピン: 1回1000mg/m ² を1日2回 day2-15 CDDP後4日目以降、ソリューゲンとソリタ中止可
外科	030115A01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	外科	ゼローダ: Day1-14(1日2回)1000mg/m ² /回 カベシタピン: 1回1000mg/m ² を1日2回 2週服用1週休薬

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030115A02	ハーセプチン(継続6mg/m ²)+XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	外科	ゼローダ: Day1-14(1日2回)1000mg/m ² /回 カペシチン: 1回1000mg/m ² を1日2回 2週服用1週休薬
外科	030120A01	WHF療法(Weekly High dose 5FU)	7	フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [1000 mg/m ²]<1> 生理食塩液(20ml) [1 mL]<1>	外科	
外科	030130A01	アブラキサン(PTXアルブミン懸濁型)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注(100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [260 mg/m ²]<1> 大塚生食注(100ml) [1 mL]<1>	外科	
外科	030133A01	エピルビシン(50mg/body)+リピオドール	7	エピルビシン塩酸塩注射用(10mg) [50 mg/Body]<1> リピオドール480注(10ml) [1 A]<1>	外科	エピルビシン(50mg/body)+リピオドール
外科	030135A01	カドサイラ療法(患者限定)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]カドサイラ(100mg) [3.6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	外科	初回は90分で投与
外科	030136A01	サイラムザ+weeklyPTX	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注(100ml) [1 本]<1,8,15> 注]サイラムザ(100mg/10ml) [8 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5%(250ml) [1 袋]<1,8,15>	外科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
外科	030136A02	サイラムザ単独	28	注]サイラムザ(100mg/10ml) [8 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,15>	外科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与前、レスタミン錠50mg内服
外科	030136A03	サイラムザ(8mg/kg)+NabPTX(100mg/m ²)(倫)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 大塚生食注(100ml) [1 本]<1,8,15> 注]サイラムザ(100mg/10ml) [8 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8,15> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [100 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液(50ml) [1 mL]<1,8,15>	外科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) サイラムザ投与前、レスタミン錠50mg内服
外科	030140A01	ハラヴェン療法	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液(20ml) [1 mL]<1,8>	外科	
外科	030141A03	ハーセプチン(3週毎・初回8mg/kg)	21	注]トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030141A04	ハーセプチン(3週毎・継続6mg/kg)	21	注]トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030142C01	ハーセプチン(初回8mg/kg) + アブラキサン(患者限定)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [260 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 mL]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	
外科	030142C02	ハーセプチン(継続6mg/kg) + アブラキサン (患者限定)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [260 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 mL]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	
外科	030143A01	ハーセプチン(初回8mg/kg) + CDDP + S-1	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-5> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-5> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<2> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	外科	S-1:Day2-15(1日2回) S-1:1日2回 day2-15 CDDP後4日目以降、ソリューゲンとソリタ中止可
外科	030143A02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+CDDP+S-1	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-5> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-5> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<2> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	外科	S-1:Day2-15(1日2回) S-1:1日2回 day2-15 CDDP後4日目以降、ソリューゲンとソリタ中止可

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030144A01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+DTX(75mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ²
外科	030144A02	ハーセプチン(継続6mg/kg) + DTX(75mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ²
外科	030145A01	ハーセプチン(初回8mg/kg・3週毎) + VNR	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 毒)ロゼウス静注液(10mg/1ml) [25 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	
外科	030145A02	ハーセプチン(継続6mg/kg・3週毎) + VNR	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 毒)ロゼウス静注液(10mg/1ml) [25 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	
外科	030146A01	ハーセプチン(初回8mg/kg + wPTX(80mg/m ²)療法	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	Rp1投与時レスタミン50mg、要確認:アルコール可否 RP1投与時、レスタミン錠50mg服用
外科	030146A02	ハーセプチン(継続6mg/kg) + wPTX療法(80mg/m ²)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	Rp1投与時レスタミン50mg、要確認:アルコール可否 RP1投与時、レスタミン錠50mg服用

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030146C01	ハーセプチン(継続6mg/kg) + wPTX(80mg/m ²) 3週クール	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 注)トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	Rp1投与時レスタミン50mg、要確認:アルコール可否 RP1投与時、レスタミン錠50mg服用
外科	030147A01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+ハラヴェン療法	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1,8> 注)トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	
外科	030147A02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+ハラヴェン療法	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1,8> 注)トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	外科	
外科	030147B01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+ハーパージェタ(初回)+ハラヴェン(倫)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1,8> 注)ハーパージェタ(420mg/14ml) [840 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 注)トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1>	外科	
外科	030147B02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+ハーパージェタ(継続)+ハラヴェン(倫)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1,8> 注)ハーパージェタ(420mg/14ml) [420 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 注)トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1>	外科	
外科	030147B03	ハーセプチン(初回8mg/kg)+ハーパージェタ(継続)+ハラヴェン(倫)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1,8> 注)ハーパージェタ(420mg/14ml) [420 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 注)トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1>	外科	
外科	030147B04	ハーセプチン(継続6mg/kg)+ハーパージェタ(初回)+ハラヴェン(倫)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1,8> 注)ハーパージェタ(420mg/14ml) [840 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 注)トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
外科	030147C01	フェスコIN(初回)+ハラヴェン(倫)(患者限定)	21	フェスコ配合皮下注【IN】(15mL/V) [15 mL/Body]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1,8>	外科	フェスコは皮下注で投与
外科	030147C02	フェスコMA(継続)+ハラヴェン(倫)	21	フェスコ配合皮下注<MA> (10mL/V) [10 mL/Body]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 毒)ハラヴェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1,8>	外科	フェスコは皮下注で投与
外科	030148A01	サイラムザ+FOLFIRI	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]サイラムザ(100mg/10ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,3> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1>	外科	レスタミン50mg (ケモ当日) Rp1投与時 レスタミン錠50mg内服
外科	030148A02	サイラムザ+FOLFIRI(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]サイラムザ(100mg/10ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	レスタミン50mg (ケモ当日) Rp1投与時 レスタミン錠50mg内服
外科	030150A01	パージェタ(初回)+ハーセプチン(初回 8mg/kg)+DTX(75mg/m ²)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [840 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ²

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030150A02	パージェタ(初回)+ハーセプチン(継続 6mg/kg)+DTX(75mg/m ²)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [840 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ²
外科	030150A03	パージェタ+ハーセプチン(継続 6mg/kg)+DTX(75mg/m ²)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [420 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ²
外科	030150A04	フェスコ`IN(初回)+DTX(75mg/m ²)(患者限定)	21	フェスコ配合皮下注[IN] (15mL/V) [15 mL/Body]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ² フェスコ`は皮下注で投与
外科	030150A05	フェスコ`MA(継続)+DTX(75mg/m ²)	21	フェスコ配合皮下注<MA> (10mL/V) [10 mL/Body]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ² フェスコ`は皮下注で投与
外科	030150B01	パージェタ(初回)+ハーセプチン(初 回)+DTX(75mg/m ²)+CBDCA(AUC6)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [840 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ² DTX:60~75mg/m ² 、CBDCA:AUC5~6

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030150B02	パージェタ(初回)+ハーセプチン(継続)+DTX(75mg/m ²)+CBDCA(AUC6)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [840 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ`ロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ² DTX:60~75mg/m ² 、CBDCA:AUC5~6
外科	030150B03	パージェタ(継続)+ハーセプチン(継続)+DTX(75mg/m ²)+CBDCA(AUC6)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [420 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ`ロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ² DTX:60~75mg/m ² 、CBDCA:AUC5~6
外科	030150B04	フェスコ`IN(初回)+DTX(75mg/m <sup>2</sup>)+CBDCA(AUC6)(患者限定)	21	フェスコ配合皮下注[IN] (15mL/V) [15 mL/Body]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ`ロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ² DTX:60~75mg/m ² 、CBDCA:AUC5~6 フェスコ`は皮下注で投与
外科	030150B05	フェスコ`MA(継続)+DTX(75mg/m <sup>2</sup>)+CBDCA(AUC6)	21	フェスコ配合皮下注<MA> (10mL/V) [10 mL/Body]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ`ロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1>	外科	DTX:通常量60mg/m ² DTX:60~75mg/m ² 、CBDCA:AUC5~6 フェスコ`は皮下注で投与
外科	030151A01	パージェタ(初回)+ハーセプチン(初回8mg/kg/3週毎)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [840 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030151A02	パージェタ(初回)+ハーセプチン(継続6mg/kg/3週毎)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [840 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030151A03	パージェタ(2回目以降)+ハーセプチン(継続6mg/kg/3週毎)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [420 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030151A04	パージェタ(2回目以降)+ハーセプチン(8mg/kg)	21	注]パージェタ(420mg/14ml) [420 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	Her 8mg/kg(延期時の増量用)
外科	030151A05	フェスコIN(初回)(患者限定)	21	フェスコ配合皮下注[IN] (15mL/V) [15 mL/Body]<1>	外科	フェスコは皮下注で投与
外科	030151A06	フェスコMA(継続)	21	フェスコ配合皮下注<MA> (10mL/V) [10 mL/Body]<1>	外科	フェスコは皮下注で投与
外科	030152A02	エンハーツ(6.4mg/kg) (胃癌)【患者限定】	21	グラニセロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 大塚糖液5% 100ml [1 本]<1> 注]エンハーツ点滴静注用(100mg) [6.4 mg/kg]<1>	外科	適応:3rd以降の胃癌
外科	030152A03	エンハーツ(5.4mg/kg)(乳癌)【患者限定】	21	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 大塚糖液5% 100ml [1 本]<1> 注]エンハーツ点滴静注用(100mg) [5.4 mg/kg]<1>	外科	適応:2rd以降のHER2陽性又は低発現の乳癌
外科	030155A00	DC療法(DTX+CPA)	21	グラニセロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注射用エンドキサン (500mg) [600 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% 100ml [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	デキサメタゾン8mg内服Day2-4 Dex 経口:8mg/2x Day2-4
外科	030160A01	FOLFIRINOX modified (膵臓) (インフューザー)	14	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030160A02	FOLFIRINOX modified (臍臓)	14	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,3> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1>	外科	
外科	030160B01	オニバイト [®] (70mg/m ²)+I-LV/5FU	14	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> オニバイト点滴静注 (43mg/10ml) [70 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	外科	
外科	030165A01	MTX+キロサイド [®] (髄注)【患者限定】	2	注射用メソトレキセート (5mg) [10 mg/Body]<1> キロサイド注 (40mg/2ml) [20 mg/Body]<1> 水溶性プレドニン (20mg) [1 A]<1> 大塚蒸留水 (20ml) [4 mL]<1>	外科	癌性髄膜炎
外科	030170A02	オブジーボ [®] (240mg/Body/2W)	14	注】オブジーボ (240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030170A03	オブジーボ [®] (480mg/Body/4W)	28	注】オブジーボ (240mg/24ml) [480 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	
外科	030170B01	オブジーボ [®] (240mg/Body)+ヤーボイ [®] (1mg/kg) /3週毎 【患者限定】	21	注】オブジーボ (240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注】ヤーボイ (50mg/10ml) [1 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [30 mL]<1>	外科	MSI-h 結腸直腸癌
外科	030171A01	キイトルーダ [®] (200mg/Body/3w)	21	注】キイトルーダ (100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	進行・再発のMSI-High
外科	030171A02	キイトルーダ [®] (400mg/Body/6w)	42	注】キイトルーダ (100mg/4ml) [400 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	外科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
外科	030171B01	キイトルーダ(200mg/Body)+GEM+CBDCA (AUC2)/3w	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [2 mg/GFR+25]<1,8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8>	外科	CBDCA:AUC2で計算される TNBC
外科	030172A01	テセントリク(840mg)+Nab-PTX(100mg/m ²)【患者限定】	28	注]テセントリク(840mg/14ml) [840 mg/Body]<1,15> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [100 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1,8,15>	外科	TNBC【患者限定】
脳神経外科	050001A01	テモダール75mg/m ² (初発・放射線併用)	14	毒)テモダール点滴静注用(100mg) [75 mg/m ²]<1-14> 大塚蒸留水 (100ml) [1 mL]<1-14> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-14>	脳神経外科	(初発・照射併用)42日間投与し4週間休薬 【調製法1】テモダール:1Vあたり蒸留水41mlを加える(溶解後2.5mg/ml) 【調製法2】残りの蒸留水を破棄して溶解したテモダールを加える
脳神経外科	050001A02	テモダール150mg/m ² (単剤)	28	毒)テモダール点滴静注用(100mg) [150 mg/m ²]<1-5> 大塚蒸留水 (100ml) [1 mL]<1-5> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-5>	脳神経外科	(単剤)5日間投与、23日休薬 【調製法1】テモダール:1Vあたり蒸留水41mlを加える(溶解後2.5ml/ml) 【調製法2】残りの蒸留水を破棄し溶解したテモダールを加える
脳神経外科	050002A01	Bevacizumab単剤(10mg/kg・2週毎)	14	注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [10 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	脳神経外科	
脳神経外科	050002A02	Bevacizumab単剤(15mg/kg・3週毎)	21	注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [15 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	脳神経外科	
泌尿器科	070001A01	BEP療法	21	YDソリターT3号輸液 (500ml) [1 本]<1-6> ソリアセトD輸液 (500ml) [1 袋]<1-6> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<2-6> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-6> エトポシド点滴静注液(100mg/5ml)「SN」 [100 mg/m ²]<2-6> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2-6> YDソリターT3号輸液 (500ml) [2 本]<7-9,16> ブレオ (5mg) [30 mg/Body]<2,9,16> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2,9,16> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<2-6> マンニトール注射液20% (300ml) [100 mL]<2-6> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [20 mg/m ²]<2-6>	泌尿器科	4回まで BLM:300mg/bodyを超えない【4クールを行う場合は10回で中止】
泌尿器科	070002A01	Docetaxel療法(前立腺癌)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [70 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	泌尿器科	PSL 10mg/2×朝昼(連日投与) PSL 10mg/2×
泌尿器科	070003A01	Gemzar療法	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	泌尿器科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
泌尿器科	070003C01	Gemzar (250mg/m ²) + 放射線併用	35	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A] <1,8,15,22,29> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル] <1,8,15,22,29> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [250 mg/m ²] <1,8,15,22,29> 大塚生食注 (100ml) [1 本] <1,8,15,22,29> 生理食塩液 (50ml) [1 本] <1,8,15,22,29>	泌尿器科	放射線併用レジメン 1クールのみ
泌尿器科	070004A01	GEM+CDDP	28	デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル] <1-4,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²] <1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本] <1,8,15> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [3 本] <1> 生理食塩液 (1L) [1 袋] <2,4> パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL) 「タイホウ」 [1 バイアル] <2> 生理食塩液 (50ml) [1 本] <2,8,15> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル] <2> 生理食塩液 (200ml) [1 本] <2> 注]毒)シスプラチン注 (10mg/20ml) [70 mg/m ²] <2> 生理食塩液「AY」 (500ml) [250 mL] <2> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋] <2> プリンペラン注射液0.5% (10mg/2ml) [2 A] <2-3> 生理食塩液 (1L) [2 袋] <3> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本] <4>	泌尿器科	
泌尿器科	070004B01	GEM+CDDP (3週毎 NAC)	21	デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル] <1-4,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²] <1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本] <1,8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [3 本] <1> 生理食塩液 (1L) [1 袋] <2,4> パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL) 「タイホウ」 [1 バイアル] <2> 生理食塩液 (50ml) [1 本] <2,8> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル] <2> 生理食塩液 (200ml) [1 本] <2> 注]毒)シスプラチン注 (10mg/20ml) [70 mg/m ²] <2> 生理食塩液「AY」 (500ml) [250 mL] <2> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋] <2> プリンペラン注射液0.5% (10mg/2ml) [2 A] <2-3> 生理食塩液 (1L) [2 袋] <3> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本] <4>	泌尿器科	【NAC3～4回】
泌尿器科	070005A01	GEM+CBDCA	28	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A] <1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル] <1,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²] <1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本] <1,8,15> 注]毒)カルボプラチン (50mg/5ml) [5 mg/GFR+25] <1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋] <1> 生理食塩液 (50ml) [1 本] <1,8,15>	泌尿器科	CBDCA: AUC5で計算される 制吐剤: Dex(内服)8mg/Day(Day2-4)
泌尿器科	070005C01	GEM+CDGP(患者限定)	28	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本] <1-3> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A] <1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル] <1,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²] <1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本] <1,8,15> 毒)アクブラ静注用 (50mg) [70 mg/m ²] <1> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋] <1-3> 生理食塩液 (50ml) [1 本] <8,15>	泌尿器科	制吐剤: Dex(内服)8mg(Day2-4) 制吐剤: Dex(内服)8mg(Day2-4)

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
泌尿器科	070006A01	MEC療法	28	ソルアセトD輸液 (500ml) [1 袋]<1-3> メイロン静注7% (20ml) [2 A]<1> 注射用メソトレキセート (5mg) [30 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15> ソルアセトD輸液 (500ml) [2 袋]<1,4-6> YDソリターT3号輸液 (500ml) [2 本]<1-3> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1-3> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-3> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-3> エピルピシン塩酸塩注射用 (10mg) [50 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2-3> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<2-3> マンニトール注射液20% (300ml) [100 mL]<2-3> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [50 mg/m ²]<2-3> YDソリターT3号輸液 (500ml) [1 本]<4-6>	泌尿器科	イメント [®] 125mg(day1)80mg(2-5)Dex8mg/day(4-6) 制吐剤: イメント [®] 125mg(Day1),80mg(Day2-5),Dex(内服)8mg/Day(Day4-6)
泌尿器科	070007C01	TIN(患者限定)	28	ソルアセトD輸液 (500ml) [2 袋]<1-6> YDソリターT3号輸液 (500ml) [1 本]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-4> ポララミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<2> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> 毒)バクリタキセル注射液(30mg/5mL) [175 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2-4> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<2> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<2> 毒)アクブラ静注用 (50mg) [70 mg/m ²]<2> ウロミテキサン注 (100mg/1ml) [4 A]<2-4> 注射用イホマイド (1g) [1500 mg/m ²]<2-4> YDソリターT3号輸液 (500ml) [2 本]<2-6>	泌尿器科	アルコール過敏要確認 要確認: アルコール可否
泌尿器科	070009A01	CDDP+ETOP	21	YDソリターT3号輸液 (500ml) [2 本]<1,4> パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-4> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<2> エトポシド点滴静注液 (100mg/5ml)「SN」 [100 mg/m ²]<2-4> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2-4> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<2> YDソリターT3号輸液 (500ml) [4 本]<2-3> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<3-4>	泌尿器科	
泌尿器科	070010C01	CBDCA+ETOP	21	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1-3> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-3> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-3> エトポシド点滴静注液 (100mg/5ml)「SN」 [100 mg/m ²]<1-3> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1-3> 注】毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-3>	泌尿器科	CBDCA: AUC6で計算される

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
泌尿器科	070010C02	CBDCA(AUC=7)単剤	21	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 パリアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 パリアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パリアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [7 mg/GFR+25]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	泌尿器科	CBDCA:AUC7 精巣腫瘍 Stage I
泌尿器科	070011A01	ジェブタナ(患者限定)	21	大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パリアル]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1> 毒)ジェブタナ点滴静注(60mg) [25 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> ヘクフルグラスチムBS皮下注(3.6mg/0.36mL)「ニフロ」[1 筒]<2>	泌尿器科	PSL10mg/日 (連日投与) PSL10mg/日
泌尿器科	070020A01	エピルビシン膀胱注用(50mg/body)	7	エピルビシン塩酸塩注射用(50mg) [50 mg/Body]<1> 生理食塩液 (50ml) [50 mL]<1>	泌尿器科	膀胱注用
泌尿器科	070020A02	エピルビシン膀胱注手術用(50mg/body)	7	エピルビシン塩酸塩注射用(50mg) [50 mg/Body]<1> 生理食塩液 (50ml) [50 mL]<1>	泌尿器科	膀胱(手術時用)
泌尿器科	070030A02	オブジーボ (240mg/Body/2W)	14	注]オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	泌尿器科	
泌尿器科	070030A03	オブジーボ (480mg/Body/4W)	28	注]オブジーボ(240mg/24ml) [480 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	泌尿器科	
泌尿器科	070030B01	オブジーボ(240mg/Body)+ヤーボイ(1mg/kg) /3週毎【患者限定】	21	注]オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ヤーボイ(50mg/10ml) [1 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [30 mL]<1>	泌尿器科	治癒切除不能又は転移性腎がん 1stLine
泌尿器科	070031A01	キイトルーダ (200mg/body 3週間)	21	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	泌尿器科	
泌尿器科	070031A02	キイトルーダ (400mg/Body/6w)	42	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [400 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	泌尿器科	
泌尿器科	070031B01	パドセブ(1.25mg/kg)+キイトルーダ (200mg/Body)/3w (患者限定)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パリアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> パドセブ点滴静注用(30mg) [1.25 mg/kg]<1,8> 注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1>	泌尿器科	
泌尿器科	070032A01	パベンチオ (10mg/kg/2w)	14	注]パベンチオ点滴静注 (200mg/10mL) [10 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	泌尿器科	前投与:レスタミン50mg、アセトアミノフェン500mg処方 30分前にレスタミン5錠、アセトアミノフェン500mg服
泌尿器科	070040A01	パドセブ(1.25mg/kg) (患者限定)	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パリアル]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> パドセブ点滴静注用(30mg) [1.25 mg/kg]<1,8,15>	泌尿器科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
産婦人科	080001A02	BEP療法	21	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-5,15> グラニセロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1-5> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1-5> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-5> ブレオ (5mg) [30 mg/Body]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> エトポシド点滴静注液 (100mg/5ml)「SN」 [100 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1-5> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [20 mg/m ²]<1-5> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1-5> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1-5>	産婦人科	4回まで
産婦人科	080002A01	CPT-11(60mg/m ²)+CDDP(60mg/m ²)	28	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1,3-4> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<2> パロノセロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-4,9,16> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<2-4,9,16> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2,9,16> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [60 mg/m ²]<2,9,16> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2,9,16> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [60 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<2-4> ソルアセトD輸液 (500ml) [1 袋]<2-4> グラニセロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<9,16>	産婦人科	イメント:シスプラチンの投与日に服用
産婦人科	080005A01	CPT-11(A法:100mg/m ² ・3投2休)	35	グラニセロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [100 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	産婦人科	
産婦人科	080010B01	TriWeeklyDC(DTX75mg/m ² 、CBDCA AUC6)	21	パロノセロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [75 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	DTX:60~75 CBDCA:5~6 アブレタント併用 DTX:60~75mg/m ² ・CBDCA:AUC5~6
産婦人科	080010C01	WeeklyDC(DTX:25mg/m ² ・CBDCA:AUC5)	28	グラニセロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [25 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1,8,15> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	産婦人科	Weekly Docetaxel アブレタント併用 DTX:25mg/m ² /回・CBDCA:AUC5 アブレタント併用

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
産婦人科	080011A01	DTX単独(70mg/m ²)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 【毒】ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [70 mg/m ²]<1> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	産婦人科	タキソテール60mg～70mg/m ²
産婦人科	080020B01	Gem(1000mg/m ²)単剤	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8,15>	産婦人科	
産婦人科	080021A01	Gem(900mg/m ²)+DTX(75mg/m ²)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 【毒】ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [75 mg/m ²]<8> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [900 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8>	産婦人科	
産婦人科	080022A01	Gem+ドキシル	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> ドキシル注 (20mg/10ml) [25 mg/m ²]<8> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [800 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8>	産婦人科	
産婦人科	080023A01	Gem+CBDCA(AUC=4)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 【毒】カルボプラチン(50mg/5ml) [4 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8>	産婦人科	
産婦人科	080024A01	Gem+CBDCA(AUC=4)+Beva	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 【注】アバスタチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 【毒】カルボプラチン(50mg/5ml) [4 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8>	産婦人科	
産婦人科	080030A01	IAP療法(Carcinosarcoma用)	21	生理食塩液(1L) [1 袋]<1-5> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1-5> ドキソルビシン塩酸塩注射液(10mg/5ml) [45 mg/m ²]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 【毒】シスプラチン注(10mg/20ml) [50 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1-5> ウロミテキサン注 (100mg/1ml) [4 A]<1-5> 注射用イホマイド (1g) [1000 mg/m ²]<1-5>	産婦人科	要処方アプレピタント ウロミテキサンはイホマイドの20%量 アプレピタント:初日デキサート1時間前、2日目以降は午前に服用

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
産婦人科	080040B01	TriWeeklyTC(PTX175mg/m ² CBDCA AUC5)	21	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [2 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [175 mg/m ²]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	産婦人科	レスタミン、アプレピタント併用 アルコール過敏要確認 レスタミン錠 アプレピタント内服 要確認アルコール可否
産婦人科	080040B04	DoseDenseTC(PTX80mg/m ² CBDCA AUC6)	21	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,8,15> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8,15>	産婦人科	レスタミン、アプレピタント併用 アルコール過敏要確認 レスタミン:点滴開始30分前に服用 アプレピタント:カルボプラチン投与日のみレスタミンと同時に服用 要確認アルコール可否
産婦人科	080041A01	PTX(weekly3投1休)(80mg/m ²)	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8,15>	産婦人科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服 要確認アルコール可否
産婦人科	080041A02	TriweeklyPTX(210mg/m ²) 卵巣癌・子宮体癌	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [2 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [210 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	産婦人科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
産婦人科	080050A01	CDDP(40mg/m ² /1w)+RT併用	42	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-2,8-9,15-16,22-23,29-30,36-37> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<2,9,16,23,30,37> ソリューゲンF注(500ml) [3 本]<3,10,17,24,31,38> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<2,9,16,23,30,37> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2,9,16,23,30,37> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2,9,16,23,30,37> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<2,9,16,23,30,37> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [40 mg/m ²]<2,9,16,23,30,37> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2,9,16,23,30,37>	産婦人科	アプレピタント内服併用 シスプラチン投与日アプレピタント125mg服用、その後2日間は朝に80mg服用
産婦人科	080050A02	CDDP(40mg/m ² /1w)+キイトルーダ [®] (200mg/Body/3w)+RT併用	43	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-2,8-9,15-16,22-23,29-30,36-37> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<2,9,16,23,30,37> ソリューゲンF注(500ml) [3 本]<3,10,17,24,31,38> 生理食塩液(50ml) [1 本]<2,23> 注]キイトルーダ [®] (100mg/4ml) [200 mg/Body]<2,23> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<2,9,16,23,30,37> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<2,9,16,23,30,37> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2,9,16,23,30,37> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2,9,16,23,30,37> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [40 mg/m ²]<2,9,16,23,30,37> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2,9,16,23,30,37>	産婦人科	アプレピタント内服併用 シスプラチン投与日アプレピタント125mg服用、その後2日間は朝に80mg服用

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
産婦人科	080060A01	キイトルーダ [®] (200mg/Body/3w)	21	注]キイトルーダ (100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	
産婦人科	080060A02	キイトルーダ [®] (400mg/Body/6w)	42	注]キイトルーダ (100mg/4ml) [400 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	
産婦人科	080100A01	ドキシル (体表面積1.8㎡未満)	28	デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> ドキシル注 (20mg/10ml) [50 mg/㎡]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	ドキシル投与時、手首足首クーリング
産婦人科	080100A02	ドキシル (40mg/㎡)+Beva (10mg/kg 2週毎)	28	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> ドキシル注 (20mg/10ml) [40 mg/㎡]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注]アバスチン (100mg/4ml) [10 mg/kg]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	産婦人科	アバスチン初回90分、2回目60分、3回目以降30分で ドキシル投与時、手首足首クーリング
産婦人科	080100A03	ドキシル (体表面積1.8㎡以上)	28	デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> ドキシル注 (20mg/10ml) [50 mg/㎡]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	ドキシル投与時、手首足首クーリング
産婦人科	080100A04	ドキシル+CBDCA (AUC=5)	28	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> ドキシル注 (20mg/10ml) [30 mg/㎡]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン (50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	ドキシル投与時、手首足首クーリング アプレミタント服用
産婦人科	080101A02	ハイカムチン+Beva	20	デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-5> ハイカムチン注射用 (1.1mg) [1.25 mg/㎡]<1-5> 注]ペバシズマブBS (100mg/4ml)「ファイザー」 [15 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-5>	産婦人科	卵巣がん プラチナ耐性
産婦人科	080102A01	アバスチン + ハイカムチン (0.75mg /㎡) + PTX	20	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1-3> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [2 バイアル]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」 (20mg/20ml) [1 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-3> 毒)パクリタキセル注射液 (30mg/5mL) [175 mg/㎡]<1> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋]<1> ハイカムチン注射用 (1.1mg) [0.75 mg/㎡]<1-3> 注]アバスチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-3>	産婦人科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg (ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服 (Day1のみ) 要確認アルコール可否 (パクリタキセル)

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名〔標準投与量〕〔投薬日〕	適応	備考
産婦人科	080103A01	AP(DXR60mg/m ² +CDDP50mg/m ²)療法	21	生理食塩液(1L) [1 袋]<1> 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) [8 mL]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> ドキシルビシン塩酸塩注射液(10mg/5ml) [60 mg/m ²]<1> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1> 注〕毒〕シスプラチン注(10mg/20ml) [50 mg/m ²]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液〔AY〕(500ml) [1 袋]<1>	産婦人科	子宮体癌
産婦人科	080104A01	ハラウェン療法	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8> 毒〕ハラウェン静注(1mg/2ml) [1.4 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液(20ml) [1 mL]<1,8>	産婦人科	
産婦人科	080105A01	トキソリビシン 75mg/m ² 3w毎	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> アドリアシン注用 (10mg) [75 mg/m ²]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	産婦人科	総投与量500mg/m ² まで
産婦人科	080106A01	リブタヨ【患者限定】	21	注〕リブタヨ点滴静注(350mg/7mL) [350 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	産婦人科	
産婦人科	080107A01	テブダック【患者限定】	21	テブダック点滴静注用(40mg) [2 mg/kg]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	産婦人科	点眼必要 副腎ステロイド・プリモジン・ドライアイ テブダック投与5分前から投与終了後30分まで 両眼冷却パック使用 投与直前に両眼にプリモジン点眼使用 1日数回ドライアイ治療点眼使用 投与前日より計4日間副腎ステロイド点眼使
産婦人科	080200A01	アバスチン単剤	21	注〕アバスチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	産婦人科	初回のみ90分で投与
産婦人科	080200B01	アバスチン+キイトルーダ	21	注〕キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注〕アバスチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1>	産婦人科	
産婦人科	080201A02	WeeklyTC(PTX70mg/m ² ・CBDCA:AUC5)+Beva	28	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 毒〕パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [70 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1,8,15> 注〕毒〕カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 注〕アバスチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<8,15> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1,8,15>	産婦人科	要確認:アルコール可否 レスタミン、アプレピタント併用 PTX130~175mg/m ² ・CBDCA:AUC4~6 ファモチジン注射時、レスタミン錠50mg、アプレピタント内服、アルコール可否確認 アバスチン、初回のみ90分、アプレピタントはカルボプラチン投与日のみ

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
産婦人科	080201B01	TC(PTX175mg/m ² ・CBDCA:AUC5)+Beva	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [2 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [175 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 注]アバスチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	要確認アルコール可否 レスタミン錠、アプレピタント併用 レスタミン錠50mg、アプレピタント併用 要確認アルコール可否
産婦人科	080201C01	TC(PTX175mg/m ² ・CBDCA:AUC5) +Beva+キイトルーダ	21	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [2 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [175 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 注]アバスチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1>	産婦人科	要確認アルコール可否 レスタミン錠、アプレピタント併用 レスタミン錠50mg、アプレピタント併用 要確認アルコール可否 TC:6クールまで、以降Pem+Bevaで継続
産婦人科	080201C02	TC(PTX175mg/m ² ・CBDCA:AUC5)+キイトルーダ	21	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [2 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [175 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1>	産婦人科	要確認アルコール可否 レスタミン錠、アプレピタント併用 レスタミン錠50mg、アプレピタント併用 要確認アルコール可否 TC:6クールまで、以降Pemで継続
産婦人科	080201D01	TC(PTX175mg/m ² ・CBDCA:AUC5)+イミフィンジ(1120mg/Body/3w)	21	注]イミフィンジ (120mg/2.4ml) [1120 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [2 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [175 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1>	産婦人科	要確認アルコール可否 レスタミン錠、アプレピタント併用 レスタミン錠50mg、アプレピタント併用 要確認アルコール可否

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
産婦人科	080202A01	DC(DTX75mg/m ² 、CBDCA:AUC6)+Beva	21	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」[75 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 注]アバスタチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	DTX60～75mg/m ² ・AUC5～6 アブレタント併用 DTX:60～75mg/m ² ・CBDCA:AUC5～6 アブレタント併用
産婦人科	080203A01	イミフィンジ [®] (1500mg/Body/4w)	28	注]イミフィンジ (500mg/10ml) [1500 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	TC+イミフィンジ [®] 後の維持療法
産婦人科	080203A02	イミフィンジ [®] (1500mg/Body/4w)+リムパ [®] -ザ [®]	28	注]イミフィンジ (500mg/10ml) [1500 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	産婦人科	TC+イミフィンジ [®] 後の維持療法 リムパ [®] -ザ [®] :pMMR リムパ [®] -ザ [®] 600mg/2x併用
産婦人科	080300A01	CDDP(80mg/m ²)+ETP(100mg/m ²)	21	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1,4> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアブレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-4> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> エトポシド点滴静注液(100mg/5ml)「SN」[100 mg/m ²]<2-4> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2-4> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<2> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [4 本]<2-3> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<3-4>	産婦人科	神経内分泌癌
産婦人科	081000A01	MTX1回投与法	7	注射用メソトレキセート (5mg) [50 mg/m ²]<1> 大塚蒸留水 (20ml) [1 mL]<1>	産婦人科	子宮外妊娠治療用
眼科	090001A02	レミケード [®] 療法(ヘーチット [®] ・継続用 ④回目以降)5mg/kg	56	レミケード点滴静注用 (100mg) [5 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	眼科	インラインフィルター使用
耳鼻咽喉科	100001A01	weekly CDDP 40mg/m ² (放射線併用療法・頭頸部癌)	65	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1,8,15,29,36> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1,8,15,29,36> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-5,9-12,16-19,30-33,37-40> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2,9,16,30,37> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<2-5,9-12,16-19,30-33,37-40> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<2-4,9-11,16-18,30-32,37-39> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [40 mg/m ²]<2,9,16,30,37> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2,9,16,30,37> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [4 本]<2-4,9-11,16-18,30-32,37-39>	耳鼻咽喉科	
耳鼻咽喉科	100002A01	Nedaplatin単独療法	28	大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> 毒)アクブラ静注用 (50mg) [100 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [4 本]<1>	耳鼻咽喉科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
耳鼻咽喉科	100003A02	wDTX25mg/m ²	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [25 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	耳鼻咽喉科	
耳鼻咽喉科	100003A03	DTX(75mg/m ²) (4週毎)	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	耳鼻咽喉科	通常量60mg/m ²
耳鼻咽喉科	100004A01	TPF療法	28	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [4 本]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-5> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<2-5> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [60 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<2-6> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [50 mg/m ²]<2> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<2> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-ワ」 [500 mg/m ²]<3-6> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<6>	耳鼻咽喉科	休薬期間28日 最大99回まで
耳鼻咽喉科	100005A01	weeklyCBDCA(AUC=1.5)+RT	7	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [1.5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	耳鼻咽喉科	放射線が中止の場合、化学療法も中止
耳鼻咽喉科	100006A01	Cetu(毎週・初回)+PTX:80mg/m ² (毎週)	7	ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 毒)パクリタキセル注射液(100mg/16.7mL) [80 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1>	耳鼻咽喉科	要確認アルコール可否 アービタックス終了後1時間経過観察 要確認アルコール可否
耳鼻咽喉科	100006A02	Cetu(毎週・継続)+PTX:80mg/m ² (毎週)	14	ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8> 毒)パクリタキセル注射液(100mg/16.7mL) [80 mg/m ²]<1,8> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8>	耳鼻咽喉科	要確認アルコール可否 要確認アルコール可否 アービタックス終了後1時間経過観察

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
耳鼻咽喉科	100006A03	PTX(80mg/m ² /毎週)	7	ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	耳鼻咽喉科	要確認アルコール可否
耳鼻咽喉科	100007A02	オプジーボ (240mg/Body/2W)	14	注]オプジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	耳鼻咽喉科	
耳鼻咽喉科	100007A03	オプジーボ (480mg/Body/4w)	28	注]オプジーボ(240mg/24ml) [480 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	耳鼻咽喉科	
耳鼻咽喉科	100008A01	Cetu(250mg/m ² 継続)	7	ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	耳鼻咽喉科	アービタックス終了後1時間経過観察
耳鼻咽喉科	100009A01	Cetu(初回)+PTX(100mg/m ²) +CBDCA(AUC=2.5) (倫)	21	ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1,8,15> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [100 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,8,15> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [2.5 mg/GFR+25]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<15> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<8,15>	耳鼻咽喉科	要確認アルコール可否
耳鼻咽喉科	100009A02	Cetu(継続)+PTX(100mg/m ²) +CBDCA(AUC=2.5) (倫)	21	ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1,8,15> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [100 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,8,15> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [2.5 mg/GFR+25]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<15> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1,8,15>	耳鼻咽喉科	要確認アルコール可否

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
耳鼻咽喉科	100010A01	Cetu(初回)+PF(CDDP100mg/m ² ・5FU1000mg/m ²)	21	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2-5,9,16> ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<2,9,16> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-5,9,16> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [100 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [1000 mg/m ²]<2-5> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<2> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<2> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<9,16> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<9,16> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<9,16>	耳鼻咽喉科	
耳鼻咽喉科	100010A02	Cetu(継続)+PF(CDDP100mg/m ² ・5FU1000mg/m ²)	21	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2-6,9,16> ポラミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<2,9,16> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-5,9,16> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<9,16> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<2,9,16> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2,9,16> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [100 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [1000 mg/m ²]<2-5> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<2> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<2>	耳鼻咽喉科	
耳鼻咽喉科	100011A01	キイトルーダ+PF(CDDP100mg/m ² ・5FU1000mg/m ²)	21	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」[1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2-6> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1.5 バイアル]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<2> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [100 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<3-5> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [1000 mg/m ²]<2-5> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<2> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<2>	耳鼻咽喉科	頭頸部癌 1stLine CPS>1以上、6回まで

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
耳鼻咽喉科	100011A02	キイトルーダ [®] (200mg/Body/3w)	21	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	耳鼻咽喉科	
耳鼻咽喉科	100011A03	キイトルーダ [®] (400mg/Body/6w)	42	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [400 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	耳鼻咽喉科	
耳鼻咽喉科	100011B01	キイトルーダ [®] +CBDCA (AUC=5)+5FU (1000mg/m ²)/3w	21	パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-5> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1.5 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-4> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [1000 mg/m ²]<1-4> 生理食塩液 (1L) [1 袋]<1-4>	耳鼻咽喉科	頭頸部癌 1stLine CPS>1以上、6回まで
放射線科	170001A01	シスプラチン動注療法	7	注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [100 mg/Body]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [0.5 A]<1>	放射線科	
消化器内科	140001B01	Beva+FOLFIRI	14	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<3>	消化器内科	
消化器内科	140001B02	Beva+FOLFIRI (インフューザー)	14	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140002B01	Beva+FOLFOX6	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<3>	消化器内科	
消化器内科	140002B02	Beva+FOLFOX6(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140003C01	Beva+IRIS(CPT-11:125mg/m ²)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [125 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	消化器内科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140003C02	Beva(7.5mg/kg)+SIR(CPT-11:150mg/m ²)/3w	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [7.5 mg/kg]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140012B01	Beva+SOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [7.5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	TS-1:Day1-14(朝・夕食後) TS-1:Day1-14(朝・夕食後)
消化器内科	140013B01	Beva+XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [7.5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	セロター:Day1-14(1日2回) カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140014B01	Beva単剤(5mg/kg/2週毎)	14	注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」[5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140014B02	Beva単剤(7.5mg/kg/3週毎)	21	注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」[7.5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140014B04	Beva+ロンサーフ (倫)	28	注]ペバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」[5 mg/kg]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	消化器内科	ロンサーフ:Day1-5、8-12 併用 ロンサーフ:Day1-5、8-12 併用
消化器内科	140020A03	Cetu単独療法(初回)	7	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 終了後1時間経過観察
消化器内科	140020A04	Cetu単独療法(継続)	7	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 終了後1時間経過観察
消化器内科	140020B01	Cetu+ビラフトビ+メクトビ(初回)	7	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	BRAF陽性:2ndLine以降 レスタミン錠50mg アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 終了後1時間経過観察 BRAF陽性 ビラフトビ300mg/1x メクトビ 90mg/併用
消化器内科	140020B02	Cetu+ビラフトビ+メクトビ(継続)	7	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	BRAF陽性:2ndLine以降 レスタミン錠50mg アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 終了後1時間経過観察 BRAF陽性 ビラフトビ300mg/1x メクトビ 90mg/併用
消化器内科	140020B03	Cetu+ビラフトビ+メクトビ(Cetu500mg/m ² /2w)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [500 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	BRAF陽性:2ndLine以降 レスタミン錠50mg アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 終了後1時間経過観察 BRAF陽性 ビラフトビ300mg/1x メクトビ 90mg/併用
消化器内科	140020C01	Cetu+ビラフトビ(初回)	7	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	BRAF陽性:2ndLine以降 レスタミン錠50mg アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 終了後1時間経過観察 BRAF陽性 ビラフトビ300mg/1x 併用

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140020C02	Cetu+ビラフトビ(継続)	7	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	BRAF陽性: 2ndLine以降 レスタミン錠50mg アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 終了後1時間経過観察 BRAF陽性 ビラフトビ300mg/1x 併用
消化器内科	140020C03	Cetu+ビラフトビ(Cetu500mg/m ² /2w)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [500 mg/m ²]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	BRAF陽性: 2ndLine以降 レスタミン錠50mg アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 終了後1時間経過観察 BRAF陽性 ビラフトビ300mg併用
消化器内科	140021B01	Cetu(毎週・初回)+FOLFOX6(インフューザー)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> グラニセترون静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> 毒)オキサリプラチン点滴静注(50mg/10ml)「ニプロ」 [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン5錠 服用 アービタックス終了後1時間経過観察
消化器内科	140021B02	Cetu(毎週・継続)+FOLFOX6(インフューザー)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> グラニセترون静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> 毒)オキサリプラチン点滴静注(50mg/10ml)「ニプロ」 [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン5錠 服用 アービタックス終了後1時間経過観察
消化器内科	140023A01	Cetu(隔週500mg/m ²)+CPT-11(150mg/m ²)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パイアル]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [500 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> グラニセترون静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> イリノテカン注(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 アービタックス終了後1時間経過観察

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140023A06	Cetu(毎週・初回)+CPT-11(150mg/m ²)/2w	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ² <1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ² <8> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ² <1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 アービタックス終了後1時間経過観察
消化器内科	140023A07	Cetu(毎週・継続)+CPT-11(150mg/m ²)/2w	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ² <1,8> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ² <1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 アービタックス終了後1時間経過観察
消化器内科	140023B01	Cetu(毎週・初回)+FOLFIRI(インフューザー)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ² <1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ² <8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> イリノテカン注(40mg/2ml) [150 mg/m ² <1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ² <1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ² <1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ² <1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 アービタックス終了後1時間経過観察
消化器内科	140023B02	Cetu(毎週・継続)+FOLFIRI(インフューザー)	14	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ² <1,8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> イリノテカン注(40mg/2ml) [150 mg/m ² <1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ² <1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ² <1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ² <1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 アービタックス終了後1時間経過観察
消化器内科	140024B03	Cetu(毎週・初回)+IRIS(CPT-11:100mg)	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15,22> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8,15,22> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ² <1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [100 mg/m ² <1,15> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ² <8,15,22> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<8,15,22>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) S-1:Day1~14 アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 アービタックス終了後1時間経過観察 S-1:Day1~14(1日2回)

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140024B04	Cetu(毎週・継続)+IRIS(CPT-11:100mg)	28	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15,22> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8,15,22> 注]アービタックス(100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1,8,15,22> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,8,15,22> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [100 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) S-1:Day1~14 アービタックス開始30分前にレスタミン錠、 5錠服用 S-1:Day1~14(1日2回) アービタックス終了後1時間経過観察
消化器内科	140030A01	CDDP+S-1	35	生理食塩液「AY」(500ml) [2 袋]<8> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<8> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<8-10> 生理食塩液(200ml) [1 本]<8> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [60 mg/m ²]<8> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<8> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<8-10> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [3 本]<8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<9-10> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<9-10>	消化器内科	TS-1:21日分(1日2回) TS-1:21日間服用(1日2回) TS-1(3週服用2週休薬)
消化器内科	140040A01	CPT-11療法(A法)	35	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15,22> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15,22> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [100 mg/m ²]<1,8,15,22> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8,15,22> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22>	消化器内科	
消化器内科	140043A01	CPT-11+5-FU+LV療法(IFL)	35	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [100 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8,15> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [250 mg/m ²]<1,8,15> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [500 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	消化器内科	
消化器内科	140044A01	CPT-11(150mg/m ²)biweekly療法	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	消化器内科	
消化器内科	140050A01	Docetaxel(60mg/m ²)(胃癌)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [60 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140050A02	Docetaxel(70mg/m ²)(食道癌)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」 [70 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140050A03	Docetaxel(75mg/m ²) (胃癌)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフロ」 [75 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	通常量60mg/m ²
消化器内科	140051A01	Docetaxel(3週毎)+S-1 (胃がん)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフロ」 [40 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	TS-1:Day1~14(1日2回) TS-1:Day1~14(1日2回)
消化器内科	140051A02	Docetaxel(2週毎)+S-1	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフロ」 [40 mg/m ²]<1,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	消化器内科	TS-1:Day1~14(1日2回) TS-1:Day1~14(1日2回)
消化器内科	140062A01	FOLFIRI	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<3>	消化器内科	
消化器内科	140062A02	FOLFIRI(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140063A01	FOLFOX6	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [4 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<3>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140063A02	FOLFOX6(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140063A06	FOLFOX(食道癌 照射併用 インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [1600 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	照射中に3クール、その後3クール追加
消化器内科	140063B01	オブジーボ®(240mg)+FOLFOX6	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,3> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [4 袋]<1>	消化器内科	適応:Her2陰性胃癌 一次治療
消化器内科	140063B02	オブジーボ®(240mg)+FOLFOX6(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	適応:Her2陰性胃癌 一次治療
消化器内科	140063C01	オブジーボ®(240mg/Body/2w)+ヤーボイ® (1mg/kg/6w)	42	注】オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1,15,29> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15,29> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15,29> 注】ヤーボイ(50mg/10ml) [1 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [30 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140063C02	オブジーボ®(360mg/Body/3w)+ヤーボイ® (1mg/kg/6w)	42	注】オブジーボ(240mg/24ml) [360 mg/Body]<1,22> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,22> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,22> 注】ヤーボイ(50mg/10ml) [1 mg/kg]<1> 生理食塩液 (50ml) [30 mL]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140064A01	FP	28	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,6> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [800 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液 (1L) [1 袋]<1-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	消化器内科	
消化器内科	140064A02	FP(術前)	21	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,6> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [800 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液 (1L) [1 袋]<1-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	消化器内科	術前化学療法:2コースを目標に行う。
消化器内科	140064A03	FP+RT(食道癌)	28	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,5> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-4> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [70 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [700 mg/m ²]<1-4> 生理食塩液 (1L) [1 袋]<1-4> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	消化器内科	
消化器内科	140064B01	CDGP+5-FU	28	ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1-5> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> 毒)アクトブラ静注用 (50mg) [90 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [800 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液 (1L) [1 袋]<1-5> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<6>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140064C01	DCF	28	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,5,15> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-4,15> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<15> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [30 mg/m ²]<1,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,15> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [800 mg/m ²]<1-4> 生理食塩液(1L) [1 袋]<1-4> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	消化器内科	食道癌
消化器内科	140064C02	DCF (NAC)	21	フィジオ140輸液(500ml) [2 袋]<1,3-6> YDソリターT3号輸液 (500ml) [1 本]<1,3-6> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-6> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニフ口」 [70 mg/m ²]<2> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [70 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [750 mg/m ²]<2-6> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2-6> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [2 袋]<2>	消化器内科	食道癌 NAC 3コース
消化器内科	140064D01	キイトルーダ [®] +FP /3W	21	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,6> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [800 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液(1L) [1 袋]<1-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140064E01	オブジーボ [®] (240mg/Body/2w) +FP	28	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,6,15> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 注]オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [800 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液(1L) [1 袋]<1-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	消化器内科	
消化器内科	140064E02	オブジーボ [®] (480mg/Body/4w) +FP	28	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,6> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 注]オブジーボ(240mg/24ml) [480 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [800 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液(1L) [1 袋]<1-5> ソリューゲンF注(500ml) [1 本]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1>	消化器内科	
消化器内科	140065A01	FOLFIRINOX modified (臓臓) (インフューザー)	14	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140066A01	FOLFOXIRI（大腸）（インフューザー）	14	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [150 mg/㎡]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/㎡]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/㎡]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/㎡]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140066B01	FOLFOXIRI+Beva（大腸）（インフューザー）	14	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注】ベバシズマブBS(100mg/4ml)「ファイザー」 [5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [150 mg/㎡]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/㎡]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/㎡]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/㎡]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140067A01	オニバイト® (70mg/㎡)+I-LV/5FU	14	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> オニバイド点滴静注 (43mg/10ml) [70 mg/㎡]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/㎡]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/㎡]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140070A01	Gemzar	28	デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/㎡]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	消化器内科	
消化器内科	140070A02	Gemzar (Biweekly)	14	デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/㎡]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140071A02	Gemzar + CDDP(マンニトール)	21	マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1,8> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1,8> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [25 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,8> ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8>	消化器内科	
消化器内科	140071A03	Gemzar+CDDP+S-1	14	マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [25 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1>	消化器内科	S-1:Day1-7 胆道癌 1stLine S-1:Day1-7
消化器内科	140071A04	Gemzar+CDDP+イミフィンジ (1500mg/Body/3w)【患者限定】	21	注】イミフィンジ (500mg/10ml) [1500 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1,8> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1,8> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1,8> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [25 mg/m ²]<1,8> ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8>	消化器内科	胆道癌 8コースまで (その後イミフィンジ単独4週毎で継続) 体重30kg以下の場合は、イミフィンジ1回 20mg/kgで投与する。
消化器内科	140071A05	イミフィンジ(1500mg/Body/4w)【患者限定】	28	注】イミフィンジ (120mg/2.4ml) [1500 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	体重30kg以下の場合は、イミフィンジ1回 20mg/kgで投与する。
消化器内科	140071A06	イジユト(300mg/Body)+イミフィンジ (1500mg/Body)/4w【患者限定】	28	注】イジユド点滴静注(300mg/15mL) [300 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注】イミフィンジ (500mg/10ml) [1500 mg/Body]<1>	消化器内科	体重30kg以下の場合は、イミフィンジ1回 20mg/kg、イジユト1回4mg/kgで投与する。
消化器内科	140071B01	Gemzar+CDDP+キイトルーダ (200mg/Body/3w)	21	注】キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1,8> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1,8> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1,8> 注】毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [25 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,8> ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8>	消化器内科	8クールまで、以降キイトルーダ+ゲムシタピンで継続 胆道癌 8コースまで (その後イミフィンジ単独4週毎で継続) 体重30kg以下の場合は、イミフィンジ1回 20mg/kgで投与する。

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140071B02	Gemzar+キイトルーダ	21	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8>	消化器内科	
消化器内科	140072A01	Gemzar + S-1(3週クール)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8>	消化器内科	TS-1:Day1-14(1日2回) TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140072A02	Gemzar + S-1(4週クール)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8>	消化器内科	TS-1:Day1-14(1日2回) TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140075A01	Gemzar + CDDP肝動注(Gem1000mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8> プリンペラン注射液0.5% (10mg/2ml) [1 A]<1,8> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8> 動注用アイエーコール (50mg) [65 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 mL]<1> 生理食塩液(1L) [1 袋]<1>	消化器内科	
消化器内科	140075A02	Gemzar + CDDP肝動注(Gem600mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> プリンペラン注射液0.5% (10mg/2ml) [1 A]<1,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [600 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15> 動注用アイエーコール (50mg) [65 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 mL]<1> 生理食塩液(1L) [1 袋]<1>	消化器内科	
消化器内科	140076A01	Gemzar+アブラキサン	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [125 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1,8,15> ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 [1000 mg/m ²]<1,8,15>	消化器内科	
消化器内科	140080A01	IRIS(CPT-11:125mg/m ²)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [125 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	消化器内科	TS-1:Day1-14(1日2回) TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140080A02	SIR(CPT-11:150mg/m ²)/3w	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	S-1:Day1-14(1日2回) S-1:Day1-14(1日2回)

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140082A01	I-LV+5-FU療法 (RPMI)	56	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [250 mg/m ² <1,8,15,22,29,36> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋]<1,8,15,22,29,36> フルオロウラシル注 (1000mg/20ml)「トーワ」 [600 mg/m ² <1,8,15,22,29,36> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36>	消化器内科	
消化器内科	140090A01	Pani単独	14	注]ペクティビックス (100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	インフュージョンリアクション注意:60分経過観察
消化器内科	140091A01	Pani+CPT-11	14	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ペクティビックス (100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [150 mg/m ² <1> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	
消化器内科	140092A01	Pani+FOLFIRI	14	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,3> 注]ペクティビックス (100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [150 mg/m ² <1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ² <1> フルオロウラシル注 (1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ² <1> フルオロウラシル注 (1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ² <1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1>	消化器内科	
消化器内科	140093A02	Pani+FOLFIRI (インフューザー)	14	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ペクティビックス (100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [150 mg/m ² <1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ² <1> フルオロウラシル注 (1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ² <1> フルオロウラシル注 (1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ² <1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140094A01	Pani+FOLFOX6	14	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,3> 注]ペクティビックス (100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン (50mg/10ml) [85 mg/m ² <1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ² <1> フルオロウラシル注 (1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ² <1> フルオロウラシル注 (1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ² <1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140094A02	Pani+FOLFOX6(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	
消化器内科	140095A01	Pani+IRIS(CPT-11:125mg/m ²)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1,15> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [125 mg/m ²]<1,15> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15>	消化器内科	TS-1:Day1-14(1日2回) TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140096A01	Pani+RPMI(5FU/I-LV)	56	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36,43> 注]ベクティビックス(100mg/5ml) [6 mg/kg]<1,15,29,43> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15,29,43> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,8,15,22,29,36> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [600 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36>	消化器内科	
消化器内科	140100A01	PMC	7	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [600 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	UFT400mg/2× Day2-7 UFT併用 Day2-7
消化器内科	140101A01	PTX+S-1	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [120 mg/m ²]<1,15> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	消化器内科	アルコール可否確認 TS-1:Day1-14 レスタミン錠50mg TS-1day1～14内服。Rp1投与時レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140102A01	PTX(3投1休)80mg/m ²	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15>	消化器内科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140102A03	PTX(6投1休)100mg/m ² (食道癌)	49	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15,22,29,36> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15,22,29,36> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36> 毒)ハクリタキセル注射液(30mg/5mL) [100 mg/m ²]<1,8,15,22,29,36> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15,22,29,36> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15,22,29,36>	消化器内科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140104A01	PTX+CBDCA	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [175 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]毒)カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	要確認アルコール可否、レスタミン錠50mg(ケモ当日) レスタミン50mg内服
消化器内科	140106A01	SOX (I-OHP130mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	TS-1:Day1-14(1日2回) TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140106A02	SOX (I-OHP100mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [100 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	胃がんI-OHP100mg/m ² TS-1:Day1-14 TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140106B01	Cetu+SOX(初回)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8,15> 注]アービタックス (100mg/20ml) [400 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<8,15> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	TS-1:Day1-14(1日2回) 要処方:レスタミン5錠 TS-1:Day1-14(1日2回) アービタックス開始30分前にレスタミン5錠内服 アービタックス終了後、1時間経過関節
消化器内科	140106B02	Cetu+SOX(継続)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1,8,15> 注]アービタックス (100mg/20ml) [250 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	TS-1:Day1-14(1日2回) 要処方:レスタミン5錠 TS-1:Day1-14(1日2回) アービタックス開始30分前にレスタミン5錠内服 アービタックス終了後、1時間経過観察
消化器内科	140106D01	オブジーボ(360mg)+SOX(I-OHP130mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]オブジーボ(240mg/24ml) [360 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	Her2陰性胃癌 一次治療 TS-1:Day1-14 TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140106E01	キイトルーダ(200mg)+SOX(I-OHP130mg/m ²)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	Her2陰性胃癌 一次治療 TS-1:Day1-14 TS-1:Day1-14(1日2回)

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140106F01	キイトルーダ [®] (200mg) + ハーセプチン (初回 8mg/kg) + SOX (I-OHP130mg/m ²)	21	注]キイトルーダ (100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	Her2陽性胃癌 一次治療 TS-1:Day1-14 TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140106F02	キイトルーダ [®] (200mg) + ハーセプチン (継続 6mg/kg) + SOX (I-OHP130mg/m ²)	21	注]キイトルーダ (100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]トラスツズマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	Her2陽性胃癌 一次治療 TS-1:Day1-14 TS-1:Day1-14(1日2回)
消化器内科	140107A01	ヒロイ (800mg/m ²) + XELOX (初回)	21	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ヒロイ点滴静注用 (100mg) [800 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 mL]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	セローダ [®] :Day1-14 レスタミン併用 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週服用1週休薬
消化器内科	140107A02	ヒロイ (600mg/m ²) + XELOX (継続用)	21	ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注]ヒロイ点滴静注用 (100mg) [600 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 mL]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」 (500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	セローダ [®] :Day1-14 レスタミン併用 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週服用1週休薬

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140107B01	ヒロイ(800mg/m ²)+FOLFOX6 (初回)	14	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注]ピロイ点滴静注用(100mg) [800 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 mL]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液(50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	レスタミン併用
消化器内科	140107B02	ヒロイ(400mg/m ²)+FOLFOX6 (継続用)	14	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」[1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> 生理食塩液(200ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注]ピロイ点滴静注用(100mg) [400 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 mL]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [85 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液(50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	レスタミン併用
消化器内科	140111A01	TEGAFOX(UFT+I-OHP)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	消化器内科	UFT:Day1~14 UFT:Day1~14
消化器内科	140112A01	XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	消化器内科	セローダ:Day1-14 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬
消化器内科	140112C01	オブジーボ(360mg)+XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注]オブジーボ(240mg/24ml) [360 mg/Body]<1> 大塚生食注(100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	Her2陰性胃癌一次治療 カペシタビン:Day1-14 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140112D01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注】トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	消化器内科	セ「ローダ」:Day1-14 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬
消化器内科	140112D02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> 注】トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	消化器内科	セ「ローダ」:Day1-14 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬
消化器内科	140112E01	キイトルーダ(200mg)+XELOX	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	Her2陰性胃癌一次治療 カペシタビン:Day1-14 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬
消化器内科	140112F01	キイトルーダ(200mg)+ハーセプチン(初回8mg/kg)+XELOX	21	注】キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注】トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	Her2陽性胃癌 一次治療 セ「ローダ」:Day1-14 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬
消化器内科	140112F02	キイトルーダ(200mg)+ハーセプチン(継続6mg/kg)+XELOX	21	注】キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注】トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注】毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	Her2陽性胃癌 一次治療 セ「ローダ」:Day1-14 カペシタビン:1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140113A01	XP(セローダ+CDDP)	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	消化器内科	セローダ: Day2-15(1日2回)1000mg/m ² /回 カペシタビン: 1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬 CDDP後4日目以降、ソリューゲンとソリタ中止可
消化器内科	140114A01	ハーセフチン(初回8mg/kg)+XP	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<2> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	消化器内科	セローダ: Day2~15 カペシタビン: 1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬 CDDP後4日目以降、ソリューゲンとソリタ中止可
消化器内科	140114A02	ハーセフチン(継続6mg/kg)+XP	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1.5 バイアル]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<2> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	消化器内科	セローダ: Day2~15 カペシタビン: 1回1000mg/m ² を1日2回 2週 服用1週休薬 CDDP後4日目以降、ソリューゲンとソリタ中止可
消化器内科	140120A01	WHF(Weekly High dose 5FU)	7	フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [1000 mg/m ²]<1> 生理食塩液 (20ml) [1 mL]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140130A01	アブラキサン(PTXアルブミン懸濁型)	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [260 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 mL]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140135A02	アイエコール肝動注(65mg/m ²)	28	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<1> 動注用アイエコール (50mg) [65 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 mL]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140136A02	アイエコール100mg/Body+リビオール(アンキオ用)	28	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1.5 バイアル]<1> 動注用アイエコール (100mg) [100 mg/Body]<1> リビオール480注 (10ml) [1 A]<1>	消化器内科	
消化器内科	140136A03	アイエコール50mg/Body+リビオール(アンキオ用)	28	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1> グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1.5 バイアル]<1> 動注用アイエコール (50mg) [50 mg/Body]<1> リビオール480注 (10ml) [1 A]<1>	消化器内科	
消化器内科	140140A01	エビルピシン(50mg/body)+ リビオール	7	エビルピシン塩酸塩注射用(10mg) [50 mg/Body]<1> リビオール480注 (10ml) [1 A]<1>	消化器内科	エビルピシン(50mg/body)+リビオール
消化器内科	140141A02	エビルピシン肝動注(アンキオ用)	28	エビルピシン塩酸塩注射用(10mg) [60 mg/Body]<1>	消化器内科	
消化器内科	140141A03	ハーセプチン(3週毎・初回8mg/kg)	21	注]トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140141A04	ハーセプチン(3週毎・継続6mg/kg)	21	注]トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140142C01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+ アブラキサン	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [260 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 mL]<1> 注]トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1>	消化器内科	
消化器内科	140142C02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+ アブラキサン	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg) [260 mg/m ²]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 mL]<1> 注]トラスツスマブBS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140143A01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+ wPTX	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 注)トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	消化器内科	要確認:アルコール可否。レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140143A02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+ wPTX	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1,8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,8,15> 毒)パクリタキセル注射液(30mg/5mL) [80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1,8,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> 注)トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1>	消化器内科	要確認:アルコール可否。レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140145A01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+ CPT-11(150mg/m ²)	42	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15,29> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15,29> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15,29> 注)トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,22> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1,15,29> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15,29> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15,22,29> 注)トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<22>	消化器内科	
消化器内科	140145A02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+CPT-11 (150mg/m ²)	42	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1,15,29> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,15,29> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15,29> 注)トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1,22> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1,22> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1,15,29> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1,15,29> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15,22,29>	消化器内科	
消化器内科	140145B01	ハーセプチン(初回8mg/kg) + SOX (I-OHP:130mg/m ²) 患者限定	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注)トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注)毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	TS-1:Day1-14 TS-1:Day1-14 (1日2回)
消化器内科	140145B02	ハーセプチン(継続6mg/kg) + SOX(I-OHP:130mg /m ²) 患者限定	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 注)トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> 注)毒)オキサリプラチン(50mg/10ml) [130 mg/m ²]<1> ブドウ糖注射液5%「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	TS-1:Day1-14 TS-1:Day1-14 (1日2回)

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140145C01	ハーセプチン(初回8mg/kg)+FOLFOX6(インフューザー)(胃)	42	注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」[8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,22> 注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」[6 mg/kg]<22> 生理食塩液(50ml)[1 本]<22> グラニセトロン静注液(3mg/3ml)[1 A]<1,15,29> デキサート注射液(6.6mg/2ml)[1 バイアル]<1,15,29> 大塚生食注(100ml)[1 本]<1,15,29> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml)[85 mg/m ²]<1,15,29> 大塚糖液5%(250ml)[1 袋]<1,15,29> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」[200 mg/m ²]<1,15,29> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」[400 mg/m ²]<1,15,29> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」[2400 mg/m ²]<1,15,29> 生理食塩液(50ml)[1 mL]<1,15,29>	消化器内科	
消化器内科	140145C02	ハーセプチン(継続6mg/kg)+FOLFOX6(インフューザー)(胃)	42	注]トラスツス`マブ`BS(60mg)「NK」[6 mg/kg]<1,22> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,22> 生理食塩液(50ml)[1 本]<22> グラニセトロン静注液(3mg/3ml)[1 A]<1,15,29> デキサート注射液(6.6mg/2ml)[1 バイアル]<1,15,29> 大塚生食注(100ml)[1 本]<1,15,29> 注]毒)オキサリプラチン(50mg/10ml)[85 mg/m ²]<1,15,29> 大塚糖液5%(250ml)[1 袋]<1,15,29> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」[200 mg/m ²]<1,15,29> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」[400 mg/m ²]<1,15,29> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」[2400 mg/m ²]<1,15,29> 生理食塩液(50ml)[1 mL]<1,15,29>	消化器内科	
消化器内科	140146A01	サイラムザ+wPTX	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml)[1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml)[1 バイアル]<1,8,15> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml)[1 A]<1,8,15> 大塚生食注(100ml)[1 本]<1,8,15> 注]サイラムザ(100mg/10ml)[8 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1,8,15> 毒)ハ`クリタキセル注射液(30mg/5mL)[80 mg/m ²]<1,8,15> 大塚糖液5%(250ml)[1 袋]<1,8,15>	消化器内科	要確認アルコール可否 レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140146A02	サイラムザ単独	28	注]サイラムザ(100mg/10ml)[8 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1,15>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与前、レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140146A03	サイラムザ(8mg/kg)+NabPTX(100mg/m ²)(倫)	28	グラニセトロン静注液(3mg/3ml)[1 A]<1,8,15> デキサート注射液(6.6mg/2ml)[1 バイアル]<1,8,15> 大塚生食注(100ml)[1 本]<1,8,15> 注]サイラムザ(100mg/10ml)[8 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1,8,15> 毒)アブラキサン点滴静注用(100mg)[100 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液(50ml)[1 mL]<1,8,15>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) サイラムザ投与前、レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140146A04	サイラムザ(8mg/kg/2w)+DTX(60mg/m ² /4w)【HGCSG 1903】	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml)[1 バイアル]<1,15> 注]サイラムザ(100mg/10ml)[8 mg/kg]<1,15> 生理食塩液(250ml)[1 袋]<1,15> 生理食塩液(50ml)[1 本]<1,15> 注]毒)ドセタキセル(20mg/1ml)「ニプロ」[60 mg/m ²]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg処方 Rp.1投与時、レスタミン錠50mg内服

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140147B01	SPT(ハーセプチン初回8mg/kg)	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]トラスツズ`マブ`BS(60mg)「NK」 [8 mg/kg]<2> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [60 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	消化器内科	TS-1:Day2~15 TS-1:Day2から2週間服用 CDDP後4日目以降、VFとST-3中止可
消化器内科	140147B02	SPT(ハーセプチン継続6mg/kg)	21	ソリューゲンF注(500ml) [2 本]<1-8> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1-8> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<2> パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<2> 生理食塩液(200ml) [1 本]<2> 注]トラスツズ`マブ`BS(60mg)「NK」 [6 mg/kg]<2> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<2> 注]毒)シスプラチン注(10mg/20ml) [60 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」(500ml) [250 mL]<2> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<2> 生理食塩液(1L) [1 袋]<2>	消化器内科	TS-1:Day2~15(1日2回) TS-1:Day2から2週間服用 CDDP後4日目以降、VFとST-3中止可
消化器内科	140148A01	サイラムザ+FOLFIRI	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]サイラムザ(100mg/10ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,3> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「ト-7」 [2400 mg/m ²]<1> ソルアセトD輸液 (500ml) [4 袋]<1>	消化器内科	レスタミン50mg (ケモ当日) Rp1投与時 レスタミン錠50mg内服

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140148A02	サイラムザ+FOLFIRI(インフューザー)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]サイラムザ(100mg/10ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液(50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	レスタミン50mg (ケモ当日) Rp1投与時 レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140148B01	ザルトラップ+FOLFIRI(インフューザー) 患者 限定	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> ザルトラップ点滴静注液(100mg/4ml) [4 mg/kg]<1> イリノテカン注(40mg/2ml) [180 mg/m ²]<1> 大塚糖液5% (250ml) [1 袋]<1> レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 [200 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [2400 mg/m ²]<1> 生理食塩液(50ml) [1 mL]<1>	消化器内科	Neut:AFL1500以上、FOLFIRI1200I以上
消化器内科	140149A01	サイラムザ + CPT-11 (biweekly)	14	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 注]サイラムザ(100mg/10ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> イリノテカン点滴静注液(40mg/2ml) [150 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1>	消化器内科	レスタミン錠50mg(ケモ当日) Rp1投与時、レスタミン錠50mg内服
消化器内科	140150A01	エンハーツ(6.4mg/kg/3w) (胃癌)【患者限 定】	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> 大塚糖液5% 100ml [1 本]<1> 注]エンハーツ点滴静注用(100mg) [6.4 mg/kg]<1>	消化器内科	適応:3rd以降の胃癌
消化器内科	140170A02	オブジーボ (240mg/Body/2W)	14	注]オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140170A03	オブジーボ (480mg/Body/4W)	28	注]オブジーボ(240mg/24ml) [480 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140170B01	オブジーボ(240mg/Body)+ヤーボイ(1mg/kg) /3週毎 【患者限定】	21	注]オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1> 注]ヤーボイ(50mg/10ml) [1 mg/kg]<1> 生理食塩液(50ml) [30 mL]<1>	消化器内科	MSI-h 結腸直腸癌
消化器内科	140171A01	キイトルーダ(200mg/Body/3w)	21	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [200 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140171A02	キイトルーダ(400mg/Body/6w)	42	注]キイトルーダ(100mg/4ml) [400 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液(50ml) [1 本]<1>	消化器内科	

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	140300C01	インフリキシマブ(300mg/body)【患者限定】	42	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[300 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140301A01	インフリキシマブ(導入用①～③投目)5mg/kg	98	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1,15,43> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1,15,43> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15,43>	消化器内科	
消化器内科	140301A02	インフリキシマブ(維持用④投目以降) 5mg/kg (1時間投与)	56	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	infusion reactionあれば1時間不可 4mg/mlを越えない濃度で(体重:80kgまで)
消化器内科	140301A03	インフリキシマブ(継続用④投以降) 5mg/kg(2 時間投与)	56	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140301A04	インフリキシマブ(クローン増悪時)10mg/kg	56	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[10 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140301A06	インフリキシマブ(維持用④投目以降) 5mg/kg (期間短縮1時間投与)	28	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	infusion reactionあれば1時間不可 4mg/mlを越えない濃度で(体重:80kgまで)
消化器内科	140301A07	インフリキシマブ(維持用④投目以降) 5mg/kg (期間短縮)	28	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」[5 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	
消化器内科	140301B01	エンタビオ(導入用 ①～②)300mg/Body	42	エンタビオ点滴静注用 (300mg) [300 mg/Body]<1,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1,15> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,15>	消化器内科	潰瘍性大腸炎 【患者限定】
消化器内科	140301B02	エンタビオ(継続用)300mg/Body/8w	56	エンタビオ点滴静注用 (300mg) [300 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	潰瘍性大腸炎 【患者限定】
消化器内科	140302A01	ステラーラ 260mg/Body (Bw55kg以下)	56	ステラーラ点滴静注(130mg/26mL) [260 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [198 mL]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	体重55kg以下:投与量260mg。
消化器内科	140302A02	ステラーラ 390mg/Body (Bw55kg超え85kg以 下)	56	ステラーラ点滴静注(130mg/26mL) [390 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [172 mL]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	体重55kgを超える85kg以下
消化器内科	140302A03	ステラーラ 520mg/Body (Bw85kg以上)	56	ステラーラ点滴静注(130mg/26mL) [520 mg/Body]<1> 生理食塩液 (250ml) [146 mL]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	体重85kgを超える:投与量520mg
消化器内科	141000A01	アリムタ+CBDCA(AUC=5) 患者限定	21	グラニセトロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 パリアル]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> ペムレキセト点滴静注液(100mg/4mL)「NK」[500 mg/m ²]<1> 注【毒】カルボプラチン(50mg/5ml) [5 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	開始1w前メチコパール2A 要処方ハンピタン メチコパール1000μg(i.m):投与1w前より開始、 その後9wごとに ハンピタン1g/1×朝(p.o):連続投与(初回のみ 1w前より開始、中止後22日間継続) 嘔気状況によりDay2～3のカイトリル2mg/日+ デキサトロン4mg/日の予防内服も可。

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	141001A01	CDDP+VP16【患者限定】	21	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1,4> パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-4> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<2> エトポシド点滴静注液 (100mg/5ml)「SN」 [100 mg/m ²]<2-4> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋]<2-4> 注]毒)シスプラチン注 (10mg/20ml) [80 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」 (500ml) [250 mL]<2> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<2> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [4 本]<2-3> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<3-4>	消化器内科	神経内分泌癌 患者限定！
消化器内科	141002A01	CBDCA+ETOP【患者限定】	21	グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<1-3> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-3> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-3> エトポシド点滴静注液 (100mg/5ml)「SN」 [100 mg/m ²]<1-3> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋]<1-3> 注]毒)カルボプラチン (50mg/5ml) [6 mg/GFR+25]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-3>	消化器内科	【膵NEC】 CBDCA:AUC6で計算される
消化器内科	141003A01	CDDP+wCPT-11(ショートハイドレ・患者限定)	28	パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1,8,15> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1,8,15> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<1> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<8,15> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<8,15> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [60 mg/m ²]<1,8,15> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋]<1,8,15> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<1> 硫酸Mg補正液 (20mEq/20ml) [8 mL]<1> マンニトール注射液20% (300ml) [1 バイアル]<1> 注]毒)シスプラチン注 (10mg/20ml) [80 mg/m ²]<1> 生理食塩液「AY」 (500ml) [250 mL]<1>	消化器内科	神経内分泌腫瘍 点滴開始よりシスプラチン終了までに1 ^{1/2} 日 程度飲水
消化器内科	141003A02	CDDP+wCPT-11(患者限定)	28	YDソリター-T3号輸液 (500ml) [2 本]<1> パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<2> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<2,9,16> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<2> デキサート注射液 (6.6mg/2ml) [1 バイアル]<2-4,9,16> 生理食塩液 (200ml) [1 本]<2> イリノテカン点滴静注液 (40mg/2ml) [60 mg/m ²]<2,9,16> 生理食塩液「AY」 (500ml) [1 袋]<2,9,16> 注]毒)シスプラチン注 (10mg/20ml) [60 mg/m ²]<2> 生理食塩液「AY」 (500ml) [250 mL]<2> ラシックス注 (20mg/2ml) [1 A]<2> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [4 本]<2> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<3-4,9,16> YDソリター-T3号輸液 (500ml) [1 本]<3-4> グラニセトロン静注液 (3mg/3ml) [1 A]<9,16>	消化器内科	神経内分泌腫瘍

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て

出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名「標準投与量」<投薬日>	適応	備考
消化器内科	141004A01	AMR 45mg/m ² 4週毎【患者限定】	28	グラニセロン静注液(3mg/3ml) [1 A]<1-3> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-3> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-3> カルセド注射用 (20mg) [45 mg/m ²]<1-3> 生理食塩液 (20ml) [1 A]<1-3>	消化器内科	NEC
消化器内科	141004B01	ザノサー(ストレプトゾシン)【患者限定】	42	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1-5> パロノセロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-5> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [1 A]<2-5> ザノサー点滴静注用(1g) [500 mg/m ²]<1-5> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-5> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1-5>	消化器内科	
消化器内科	141004B02	ザノサー(ストレプトゾシン)+5-FU【患者限定】	42	生理食塩液「AY」(500ml) [1 袋]<1-5> パロノセロン静注(0.75mg/5mL)「タイホウ」 [1 バイアル]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1-5> ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 [1 バイアル]<1> デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1-5> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [2 A]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [1 A]<2-5> ザノサー点滴静注用(1g) [500 mg/m ²]<1-5> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1-5> フルオロウラシル注(1000mg/20ml)「トーワ」 [400 mg/m ²]<1-5> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1-5>	消化器内科	
消化器内科	141005A01	テセントリク(1200mg/Body)+Beva(15mg/kg)/3w	21	注]テセントリク(1200mg/20ml) [1200 mg/Body]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 注]アバスチン (100mg/4ml) [15 mg/kg]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	肝細胞がん
消化器内科	149999A04	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 1投目】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	【COVID-19】 ステロイドとの併用が必要 【副腎皮質ステロイドと併用が必要】 インラインフィルター使用
消化器内科	149999A05	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 2投目】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	消化器内科	【COVID-19】 1投目終了後8時間以上あける インラインフィルター使用
循環器内科	150001A01	【患者限定】オンパットロ(0.3mg/kg/3w)	21	デキサート注射液(6.6mg/2ml) [1 バイアル]<1> デキサート注射液(1.65mg/0.5ml) [1 A]<1> ファモチジン静注20mg「日新」(20mg/20ml) [1 A]<1> ポララミン注0.5% (5mg/1ml) [1 A]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1> オンパットロ点滴静注2mg/ml(8.8mg/4.4ml) [0.3 mg/kg]<1> 生理食塩液(200ml) [1 mL]<1>	循環器内科	アセトアミノフェン(500) 要処方
循環器内科	159999A03	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 1投目】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液(250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	循環器内科	【COVID-19】 ステロイドとの併用が必要 【副腎皮質ステロイドと併用が必要】 インラインフィルター使用

レジメンマスター一覧

科:全科 病名:全て レジメン:全て 出力日時 2025/07/02 15:50

科	No.	レジメン名称	期間	薬剤名 [標準投与量]<投薬日>	適応	備考
循環器内科	159999A04	【COVID-19 アクテムラ8mg/kg 2投目】	1	アクテムラ点滴静注用 (80mg/4ml) [8 mg/kg]<1> 生理食塩液 (250ml) [1 袋]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>	循環器内科	【COVID-19】 1投目終了後8時間以上あける インラインフィルター使用
歯科・歯科口	900001A01	オブジーボ(240mg/Body/2W)	14	注]オブジーボ(240mg/24ml) [240 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>		
歯科・歯科口	900001A02	オブジーボ(480mg/Body/4w)	28	注]オブジーボ(240mg/24ml) [480 mg/Body]<1> 大塚生食注 (100ml) [1 本]<1> 生理食塩液 (50ml) [1 本]<1>		