

定期予防接種のご案内

令和6年度

- お子さんをさまざまな病気から守るため、生後2か月からワクチン接種が始まります。
- 「予防接種のしおり」に書かれている注意事項をよく読み、適切な時期にワクチン接種を受けましょう。

苫小牧市外で定期予防接種を受ける場合は…

- 定期予防接種は、原則として、住民登録のある市町村で接種を受けます。
- 出産のため里帰りされている場合など、苫小牧市外で接種を受けるには、事前に手続きが必要です。
- 詳しくは、苫小牧市ホームページをご覧ください。健康支援課（☎32-6407）へお問い合わせください。

定期予防接種実施医療機関一覧

- 定期予防接種は、市内の医療機関での個別接種となります。
- 接種を行う曜日が決まっている場合や、予約が必要な場合がありますので、事前にご確認をお願いいたします。

所在地	医療機関名	電話番号	Hib (ヒブ)	小児用肺炎球菌	(DPT・IPV) 四種混合	五種混合	麻しん・風しん (MR)	水痘	ジフテリア・破傷風 (DT)	子宮頸がん (HPV)	日本脳炎	B型肝炎	ロタウイルス 【使用ワクチン】	BCG
1 音羽町	合田内科小児科医院	33-9208	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
2 北光町	稲岡内科小児科	72-5141	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 北栄町	うとないキッズクリニック	53-8080	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 若草町	王子総合病院	32-8111	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 三光町	おおはた内科循環器クリニック	38-8500								●				
6 旭町	沖医院	32-8870					●		●	●				
7 緑町	加藤胃腸科内科クリニック	35-2125					●		●	●	●			
8 桜木町	桜木ファミリークリニック	71-2351	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
9 東開町	さくらファミリークリニック	55-6526	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10 北栄町	たかぎ内科・循環器内科	53-7700								●				
11 川沿町	たかせ内科クリニック	73-6233					●	●	●	●	●			
12 日新町	たかやなぎ小児科	71-2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13 拓勇西町	たくしん小児科	53-7788	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14 住吉町	とまこまいこどもクリニック	33-1050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15 清水町	苫小牧市立病院	33-3131	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16 拓勇東町	とまこまい北星皮ふとからだの クリニック	57-8000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17 弥生町	とまこまいレディースクリニック	73-5353								●				
18 東開町	沼ノ端内科・脳神経クリニック	51-2811					●	●	●	●	●	●		
19 宮前町	錦岡医院	67-0013	●	●	●	●	●	●	●		●			
20 表町	吉川医院	34-4565					●							
21 北栄町	レディースクリニックぬまのはた	53-0303								●				

予防接種に関する問合せ先：苫小牧市健康支援課（☎ 32-6407）

定期予防接種スケジュール

ワクチン名		接種回数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳
B型肝炎		3回		①	②					③						
			★ 1歳になるまでに3回接種 標準 生後2か月～生後9か月になるまでに接種 ※ 1回目と2回目は27日以上、1回目と3回目は139日以上空ける													
ロタウイルス【生】	ロタリックス	2回		①	②											
	ロタテック	3回		①	②	③										
			ロタウイルスワクチンは2種類あり、ワクチンごとに接種回数・接種スケジュールが異なります。 なお、どちらのワクチンも1回目は遅くても出生14週6日後（15週になる前）までに接種してください。 【ロタリックスの場合】 出生6週0日後から出生24週0日後までに、27日以上の間隔を空けて2回接種 【ロタテックの場合】 出生6週0日後から出生32週0日後までに、27日以上の間隔を空けて3回接種													
小児用肺炎球菌		4～1回		①	②	③									④	
			★ 生後2か月から生後60か月（5歳）になるまでに4回接種 【初回】 生後2か月～生後7か月になるまでに3回接種 【追加】 初回免疫終了後、60日以上空けて、生後12か月から生後15か月の間に1回接種													
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ Hib感染症	Hib感染症（単独）	4～1回		①	②	③									④	
	四種混合（DPT-IPV）	1期4回		①	②	③									④	
	五種混合	1期4回		①	②	③									④	
	二種混合（DT）	2期1回														①
			★ 生後2か月から生後90か月（7歳半）になるまでに4回接種 【初回】 生後2か月～生後12か月になるまでに3回接種 【追加】 初回免疫終了後、6か月以上（標準：12～18か月）空けて1回接種													
			★ 生後2か月から生後90か月（7歳半）になるまでに4回接種 【初回】 生後2か月～生後7か月になるまでに3回接種 【追加】 初回免疫終了後、6か月～18か月空けて1回接種													
			★ 11歳になってから13歳になるまでに1回接種													
BCG【生】		1回														
			★ 1歳になるまでに1回接種 標準 生後5か月から生後8か月まで													
麻しん・風しん（MR）【生】		2回														
			★ 1歳になってから2歳になるまでに1期として1回 ①													
			★ 5歳になってから7歳になるまでかつ小学校に入学する前までに2期として1回 ※幼稚園や保育園等の年長さんで接種 ②													
水痘【生】		2回														
			★ 1歳になってから3歳になるまでに2回接種 標準 ①：生後12か月から15か月になるまでに接種 ②：1回目接種後、3か月以上（標準：6～12か月）空けて接種 ①													
			★ 1歳になってから3歳になるまでに2回接種 標準 ①：生後12か月から15か月になるまでに接種 ②：1回目接種後、3か月以上（標準：6～12か月）空けて接種 ②													
日本脳炎		4回														
			★ 生後6か月から生後90か月（7歳半）になるまでに3回接種 標準 【1期初回】 3歳になってから4歳になるまでに2回接種 【1期追加】 初回接種後、6か月以上（おおむね1年）空けて1回接種 ① ② ③													
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮がん予防）		3回														
			★ 9歳になってから13歳になるまでに1回接種 標準 【2期】 9歳になってから10歳になるまでに1回接種 ④													

定期予防接種の対象年齢

標準的な接種時期（数字は接種回数）

★ 小学6年生から高校1年生に相当する年齢の間に2回又は3回
【標準的な接種開始時期】13歳（中学1年生）になる年度

予防接種を受ける前に

接種の前に チェック！

- ☐ お子さんの体調はよいですか。
- ☐ 今日受ける予防接種について、必要性や効果及び副反応など理解していますか。
わからないことがあれば、質問をメモしておきましょう。
- ☐ 『母子健康手帳』は持っていますか。
- ☐ 予診票の記入は済みましたか。
- ☐ 保護者の方が同伴できない場合には、代理人の方に委任状を渡しましたか。

予防接種を
受けることが
できない方

- [1] 接種会場（医療機関）で測定した体温が37.5℃以上のお子さん
- [2] 重とくな急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- [3] その日に受ける予防接種によって、または予防接種に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことのあるお子さん（※「アナフィラキシー」とは、通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。）
- [4] その他、医師が不適当な状態と判断したお子さん

予防接種を受けたあとは

- 【1】接種を受けたあと30分間程度は、接種した医療機関でお子さんの様子を観察するか、先生とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- 【2】接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 【3】接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすことはやめましょう。
- 【4】接種当日は、激しい運動は避けましょう。
- 【5】接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
- 【6】異なるワクチンの予防接種を受けるまでに必要な間隔は次のとおりです。

