

定期予防接種のご案内

令和7年度

- お子さんをさまざまな病気から守るために、生後2か月からワクチン接種が始まります。
- 「予防接種のしおり」に書かれている注意事項をよく読み、適切な時期にワクチン接種を受けましょう。

苫小牧市外で定期予防接種を受ける場合は…

- 定期予防接種は、原則として、住民登録のある市町村で接種を受けます。
- 出産のため里帰りされている場合など、苫小牧市外で接種を受けるには、事前に手続きが必要です。
- 詳しくは、苫小牧市ホームページをご覧いただくなか、健康支援課（☎32-6407）へお問い合わせください。

定期予防接種実施医療機関一覧

- 定期予防接種は、市内の医療機関での個別接種となります。
- 接種を行う曜日が決まっている場合や、予約が必要な場合がありますので、事前にご確認をお願いいたします。

所在地	医療機関名	電話番号	Hib (ヒブ)	小児用肺炎球菌	(DPT-IPV) 四種混合	五種混合	麻疹ん・風しん (MR)	水痘	ジフテリア・破傷風 (DT)	子宮頸がん (HPV)	日本脳炎	B型肝炎	ロタウイルス 【使用ワクチン】	BCG
1 音羽町	合田内科小児科医院	33-9208	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
2 北光町	稻岡内科小児科	72-5141	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
3 北栄町	うとないキッズクリニック	53-8080	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方 ※主にロタリックス
4 若草町	王子総合病院	32-8111	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
5 三光町	おおはた内科循環器クリニック	38-8500								●				
6 旭町	沖医院	32-8870					●		●	●				
7 緑町	加藤胃腸科内科クリニック	35-2125							●	●	●			
8 桜木町	桜木ファミリークリニック	71-2351	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
9 東開町	さくらファミリークリニック	55-6526	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
10 北栄町	たかぎ内科・循環器内科	53-7700								●				
11 川沿町	たかせ内科クリニック	73-6233					●		●	●	●			
12 日新町	たかやなぎ小児科	71-2115	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
13 拓勇西町	たくしん小児科	53-7788	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方
14 住吉町	とまこまいこどもクリニック	33-1050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタリックス
15 清水町	苫小牧市立病院	33-3131	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	両方 ※主にロタリックス
16 拓勇東町	とまこまい北星皮ふとからだのクリニック	57-8000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ロタック
17 弥生町	とまこまいレディースクリニック	73-5353								●				
18 宮前町	錦岡医院	51-2811	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
19 東開町	沼ノ端内科・脳神経クリニック	67-0013					●	●	●	●	●			
20 北栄町	レディースクリニックぬまのはた	53-0303								●				

予防接種に関する問合せ先：苫小牧市健康支援課（☎ 32-6407）

苫小牧市
TOMAKOMAI CITY, HOKKAIDO

定期予防接種スケジュール

ワクチン名	接種回数	0歳 か月 月	1歳 か月 月	2歳 か月 月	3歳 か月 月	4歳 か月 月	5歳 か月 月	6歳 か月 月	7歳 か月 月	8歳 か月 月	9歳 か月 月	10歳 か月 月	11歳 か月 月	1歳 か月 月	2歳 か月 月	3歳 か月 月	4歳 か月 月	5歳 か月 月	6歳 か月 月	7歳 か月 月	8歳 か月 月	9歳 か月 月	10歳 か月 月	11歳 か月 月	12歳 か月 月	13歳 か月 月		
B型肝炎	3回		①	②										③														
ロタウイルス【生】	2回		①	②																								
ロタテック	3回		①	②	③																							
小児用肺炎球菌	4~1回		①	②	③										④													
Hib感染症(単独)	4~1回		①	②	③										④													
ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ Hib感染症	1期4回		①	②	③										④													
五種混合	1期4回		①	②	③										④													
二種混合(DT)	2期1回																										①	
BCG【生】	1回					①																						
麻しん・風しん(MR)【生】	2回						★1歳になってから2歳になるまでに1期として1回								①										②		★5歳になってから7歳になるまでかつ小学校に入学する前までに2期として1回※幼稚園や保育園等の年長さんで接種	
水痘【生】	2回														①	②												
日本脳炎	4回														★生後6か月から生後90か月(7歳半)になるまでに3回接種 標準【1期初回】3歳になってから4歳になるまでに2回接種 【1期追加】初回接種後、6か月以上(おむね1年)空けて1回接種				①	②	③						④	
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)	3回																											

定期予防接種の対象年齢



標準的な接種時期(数字は接種回数)

★小学6年生から高校1年生に相当する年齢の間に2回又は3回【標準的な接種開始時期】13歳(中学1年生)になる年度

予防接種を受ける前に

接種の前に
チェック!

- お子さんの体調はよいですか。
- 今日受ける予防接種について、必要性や効果及び副反応など理解していますか。
- わからないことがあれば、質問をメモしておきましょう。
- 『母子健康手帳』は持っていますか。
- 予診票の記入は済みましたか。
- 保護者の方が同伴できない場合には、代理人の方に委任状を渡しましたか。

予防接種を
受けられるこ
とが
できない方

- [1] 接種会場(医療機関)で測定した体温が37.5°C以上のお子さん
- [2] 重い急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- [3] その日に受ける予防接種によって、または予防接種に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことのあるお子さん(※「アナフィラキシー」とは、通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。)
- [4] その他、医師が不適当な状態と判断したお子さん

- [1] 接種を受けたあと30分間程度は、接種した医療機関でお子さんの様子を観察するか、先生とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- [2] 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- [3] 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- [4] 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
- [5] 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
- [6] 異なるワクチンの予防接種を受けるまでに必要な間隔は次のとおりです。



予防接種を受けたあとは